

VOL

# Heinrich Junge Hameln (Weser)

(Provinz Hannover)



»Blühende Trockenmauer« am Seerosenbassin mit Plattenweg im Schaugarten meiner Gärtnerei.

Deutscher Schriftwechsel. English correspondence. Correspondance française.

1929

33. Jahrgang

1929

#### Gärtnerei-Haupteingang: Süntelstraße

etwa 30 Minuten zu Fuß vom Hauptbahnhof und 40 Minuten von Station Hameln-Klüt. Mit dem Autobus vom Hauptbahnhof bis Haltestelle Erichstraße, von dort 10 Minuten zu Fuß bis zur Gärtnerei, oder vom Hauptbahnhof bis Haltestelle Rathaus, von dort 15 Minuten zur Gärtnerei.

## Zur gefl. Beachtung!

Die Nomenklatur ist nach dem neuen Werke Dr. Zanders »Botanisches Handwörterbuch«, herausgegeben vom Reichsverband des Deutschen Gartenbaues, bis auf einige noch nicht festgesetzte Namen durchgeführt. Die alten Namen verweisen stets auf die neuen.

## Verkaufsbedingungen und Bemerkungen.

Durch Erteilung eines Auftrages erkennt jeder Käufer die nachstehend angeführten Bedingungen als für ihn rechtlich bindend an.

Mit dem Erscheinen dieses Verzeichnisses verlieren die Preise meiner früheren Ausgaben ihre Gültigkeit.

Die Preise sind in Goldmark und zwar 1 Goldmark 1971 Dollar U. S. A. gestellt und entsprechen den festgesetzten Bedingungen des B. D. St. und der D. Da-G.

Bei Abnahme von 5 Stück und mehr einer Art oder Sorte ermäßigt sich der Grundpreis um 10 Prozent (Zehnerpreis), bei Abnahme von 25 Stück und mehr um 20 Prozent (Hundertpreis).

Schaden durch höhere Gewalt, wie Streiks im Verkehr etc., schädlich gewesene Witterungseinflüsse für in Auftrag gegebene Pflanzen und Knollen entbinden mich von der Lieferung, auch wenn der Betrag für die bestellten Pflanzen schon im voraus eingesandt wurde.

Versand nur gegen bar oder Nachnahme, wenn keine anderen Vereinbarungen getroffen wurden.

Langjährigen Kunden gewähre ich auf Wunsch 30 Tage Ziel.

Alle Sendungen gehen auf Kosten und Gefahr des Bestellers.

Erfüllungsort und Gerichtsstand für Lieferung und Zahlung ist Hameln.

Für alle in meiner Gärtnerei persönlich ausgesuchten Pflanzen haben die Preise meiner Verzeichnisse keine Gültigkeit.

Die Verpackung wird auf das sorgfältigste ausgeführt und zum Selbstkostenpreis berechnet, aber nicht zurückgenommen. Für Packungs- und Portounkosten füge ich stets einige Gratisbeigaben hinzu.

Die Beförderungsweise, ob per Post, Bahnfracht oder Eilgut ist vorzuschreiben. Wird die Art des Versandes nicht vorgeschrieben, so wähle ich die mir am vorteilhaftesten erscheinende, übernehme jedoch dafür keine Verantwortung.

Beschwerden, die sich auf etwa vorkommende Versehen stützen, können nur dann Berücksichtigung finden, wenn sie sofort nach Empfang der Sendung gemacht werden.

Zur gütlichen Ausgleichung von Differenzen werde ich stets das größte Entgegenkommen zeigen. Ich leiste Ersatz bei etwa vorkommenden Irrtümern nur bis zur Höhe des Rechnungsbetrages.

Porto- und Skontoabzüge werden nicht anerkannt!

Meine Firma ist Mitglied des Bundes Deutscher Staudenzüchter, der Deutschen Dahlien-Gesellschaft, der Deutschen Dendrologischen Gesellschaft, der Deutschen Gartenbau-Gesellschaft und des Reichsverbandes des Deutschen Gartenbaues.

Versand nach allen Ländern der Welt. Telegr.-Adr.: Gärtnerei Junge Hameln.
Bankkonto: Sparkasse des Kreises Hameln-Pyrmont, Hameln.

Die Sparkasse des Kreises Hameln-Pyrmant hat Postscheckkonto Nr. 3129 Hannover. Die alte Rattenfängerstadt Hameln (mit 30000 Einwohnern) im Regierungsbezirk Hannover breitet sich innerhalb einer hervorragend schönen Umgebung am Einfluß der Hamel in die Weser aus.

Hameln liegt an den Bahnlinien Hannover-Altenbeken, Halle-Löhne und Hameln-Lage-Bielefeld und ist Haltepunkt der Eilzüge Berlin-Köln, Köln-Leipzig und umgekehrt.

#### Inhaltsverzeichnis der Gruppen A.-O.

A. Neuheiten	Seite 1	H. Moorbeetpflanzen	Seite	26
B. Allgem. Sammlung v. St	auden " 5	J. Seerosen (Nymphaeen)	11	27
C. Niedrige Stauden	,, 16	K. Sumpf- und Wasserpflanzen		29
D. Winterharte Kakteen	21	L. Winterharte Ziergräser	10	30
E. Winterharte Freilandfo	irne " 22	M. Aquarienpflanzen	24	31
F. Feuchtigkeit liebende S		N. Gladiolen	111	32
G. Felsensträucher und Sch		O. Sortimente	-	32



Aster amellus »Kobold« (Eigene Züchtung)
Eine dreijährige Pflanze in den Anlagen meiner Gärtnerei.

Aster am. »Kobold« wurde in England 1928 durch Verleihung des »Award of Merit« ausgezeichnet.

## A. Neuheiten,

seltene und durch ihre Schönheit besonders wertvolle Stauden.

## Neuheiten und besonders wertvolle Stauden eigener Zucht.

Aster amellus. Großblumige, reichblühende Staudenastern für Landschafts-Gärtnerei, für Topfpflanzenkultur und zum Blumenschnitt. (Alle Sorten wurden beschrieben und teils abgebildet in »Möllers Deutsche Gärtner-Zeitung« Jahrgang 1922 Nr. 7 und 9)

Garmer-Zenonge Jamgang 1722 Nr. 7 ond 7)	
Perkeo. 1924. Neue niedrige Zwergsorte, die für Beet- und Gruppen- bepflanzung wertvoll ist. Früh und ungeheuer reichblühend. Dunkelblau mit braun umsäumter gelber Mitte, Blume rundlich	3.00
»Schöne von Ronsdorf«. Blumen sehr groß, hell rosalila Lichtblick. 1922. Sehr großblumig, hellrosa, in reich verzweigten Rispen	1.50
blühende Prachtsorte. SeptOkt	2.50
0	
Deutscher Sieger. 1916. Dunkelrot, niedrig, frühblühend	1.50 1.50 1.50
Hunold. 1921. Dunkelblau, strahlige Blume, locker gebaute Pflanze	2.— 1.— 1.20 1.50
Weserruhm. 1914. Straff aufrecht, rundliche Blume, rosa mit leuchtend gelber	1.20
Wiktoria. 1914. Straff aufrecht, rundliche Blume, dunkelblau mit braun um-	2.50
säumter gelber Mitte	2.50

	1 St. M-
Aster ericoides Erlkönig. Hell lilafarbige, reichblühende Abart	
Aster ericoides Schneetanne. Meterhoch, Sept.—Okt. blühend, in reich mit kleinen weißen Sternblüten beladenen Zweigen	0.50
Aster hybridus Himmelskönigin. Eigenartig schöne, 80 cm hohe Herbst- aster mit dunkel purpurroten Knospen in dichten Rispen, mit den leuchtend- purpurblauen großen, offenen Blüten prächtig kontrastierend	0.80
Campanula persicifolia gigantea-Hybriden. Neue riesenblumige Rasse eigener Züchtung.	
Ausgesuchte Farben, blau und weiß, in verschiedenen Schattierungen, einfach und gefüllt	1
Helenium hybridum Goldene Jugend. 1924. Ein Sämling meiner rühm- lichst bekannten Züchtung »Julisonne«, besitzt die Neuheit alle guten Eigenschaften der Mutter in bezug auf Wuchs, Blütezeit und Dauer der Blüte, aber »Goldene Jugend« hat rein goldgelbe, große edelge- formte Blumen. Hauptblütezeit Juli, remontiert bis zum Frost. Prachtvolle	
Neuheit eigener Zucht	1.20



Helenium hybridum Wesergold. (Eigene Züchtung.)

Helenium hybridum Wesergold. 1928. Eigene Züchtung. Prachtvolle neue Schmuck- und Schnittstaude von niedrig geschlossenem, straff aufrechtem Wuchs. Hauptblütezeit Juli-August, bis zum Frost stark nachblühend. Große, rein dunkel-zitronengelbe Blüten mit braunroter Mitte. 60—80 cm hoch	1.50
Phlox setacea Elfe. 1929. Reizender, gedrungen wachsender, kurzlaubiger Polsterphlox, im Wuchs dem Phlox nivalis ähnelnd, aber mit zierlichen, zart rosa-lila Blütchen bedeckt. Blütezeit April-Mai. Eine wertvolle Bereicherung des Phlox setacea-Sortimentes. 10 cm hoch	0.80
Trollius hybridus praecox. Neue frühblühende Hybriden eigener Züchtung	1.20
2. Neuheiten anderer Züchter und besonders wertvolle Stauden.	
Anemone japonica Bühler Kind. Frühblühend, dicht gefüllt, anfangs rahm-	
weiß, später in Weiß übergehend	1.—
Anemone ignonica Frau Maadalene Uhink. Blumen aut gefüllt, hell lila-	vise record
rosa, 60—80 cm hoch. September-Oktober	0.80
Anemone japonica Max Vogel. Atlasrosa, halbgefüllt	
A I I I I I I Deleverie	0.80
Anemone japonica Luise Unink. Keinweitz, sent grotzbiumig	0.80




Philox setacea Elfe (Eigene Züchtung), an einer Trockenmauer in meinem Schaugarten.

	1 St. M.
Lauilegia coerulea hybrida (haylodgensis). Langgespornte, neue Hybriden, großblumig und aufrecht wachsend, Juni-Juli.	
candidissima, reinweiß. citrina, zitronengelb. citrina, zitronengelb. cuprea, kupferrot, Mitte gelblich. delicatissima, zartrosa mit gelb.	
Alle 4 Sorten 1 Stück:  Irmeria hybrida Schöne von Fellbach. Rein rosalila, nicht verblassend,  Blütendolden fast doppelt so groß wie bei den anderen Sorten	
Aster amellus Hermann Löns. Prächtige neue, 50 cm hochwerdende Stauden- aster, deren große, eigenartig porzellanblau gefärbte Blüten in dichten	
Sträußen die Pflanzen überdecken	1.50
karmin — purpur, 80 cm. August	0.80
Gloria purpurea. Dunkellaubige Abart der beliebten Astilbe Gloria mit leuchtend roten Blütenrispen	0.80
", Grete Püngel. Kräftig wachsend, 70—80 cm hoch, Blüten- rispen schmal, mit wagerecht abstehenden Seitenähren. Schön hellrosa	0.80
Hanna Stodt. In Wuchs und Haltung der Grete Püngel ähnlich, Blütenrispen leuchtend karminrosa	
Rispen. Rein lachsrosa, 60—70 cm. Juli-August	
Lydia Hagemann. Reichverzweigte, lange Rispen mit perl- artigen, rein lachsrosa Blüten. Wertvoll zum Schnitt, 80—90 cm.	
Juli-August	0.80
Weiße Gloria. Ein prächt. Gegenstück z. d. bekannten älteren Sorte »Gloria«, von gedrungenem Wuchs. 50—60 cm. Juli . Lan be hybrida crispa-Varietäten. 1923. Niedr., eigenart. schöne Kreuzungen.	0.80
Gnom Frischrosa autverzweigte kleine Pienen	
Kobold. Rispen dunkelrosa.  Däumling. Großblumig, hellrosa mit dunkleren Spitzen.  Alle 3 Sorten 1 Stück:	
Lattibe simplicifolia hybrida. 1923. Reizende, 20—30 cm hohe, kräftig wachsende und reichblühende Schmuckstauden für Rabatten, Felsengärten und auch zum Topfverkauf geeignet.	
von Juli-August über dicht belaubten Pflanzen.  carnea. Fleischfarbig-rosa blühend, sonst wie vorige.	
rosea. Besonders zierlich und überhängend, frisch rosa. Alle 3 Sorten 1 St.:	
Istilbe simplicifolia hybrida salmonea. Die aufrechten, reichverzweigten federigen Rispen sind von leuchtend lachsrosa Farbe	

	1 St. M.
Aster lichiangensis. Schöne, neue alpine Aster aus Westchina mit rosetten-	
artig angeordnetem Laubwerk. Blüten groß, auf 30—40 cm langen Stielen	0.80
getragen. Purpurn mit goldigbrauner Mitte. Mai-Juni	0.00
sommerblüher, ähnlich subcoeruleus. Blüte groß, auf 30-40 cm	
langen Stielen, leuchtend blau	0.70
Aster ericoides Caterham Gem. Spätblühende, reizende, haltbare Herbst-	0.70
aster mit weitausladenden Zweigen. Weiß	0.70
Cardamine pratensis lilacina plena. Reizendes, gefülltblühendes Wiesen-	
schaumkraut für feuchte Lagen. 30 cm. April	0.50
Cotyledon simplicifolia. Interessante Felsenpflanze mit zierlichen gelben	0.40
Blütenrispen und fleischigen Blättern. 10—20 cm hoch	0.60
blauen, halbgefüllten Blumen und weißem Auge. Die ganze Rispe fast	
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1.50
Delphinium hybridum Die Blonde. Halbgefüllt, kobaltblau mit rosa-lila-	
farbiger Mitte. Straff aufrecht, große, reichverzweigte Rispen von 150 cm Höhe	1.50
Delphinium hybridum Mikie Ruys. Prachtvolle Neuheit. Blumen sehr groß,	1.50
halbgefüllt, rahmweiß mit gelbem Auge. 90 cm	1.50
Delphinium hybridum F. W. Smith. Große, gefüllte, enzianblaue Blumen	2.—
Delphinium hybridum van Veens Triumph. Prachtvolle neue Sorte, gesund	2
und widerstandsfähig. Blüten halbgefüllt von zart rosalila Färbung, 120 cm	
hoch  Delphinium hybridum Vollendung. Tief kobaltblau, halbgefüllt. Große,	2
reichverzweigte Rispen von 150 cm Höhe	1.50
Helleborus niger var. praecox. Frühblühende Christrose	3
Helenium autumnale hybridum nanum praecox. Niedr. Spielarten, die	
4 Wochen vor der Stammsorte mit der Blüte beginnen, 40—80 cm, AugOkt.	0.40
<b>Helenium nanum coccineo-bruneum.</b> Frühblühend, 50-60 cm hoch.  Dunkelscharlach mit braunem Schein	0.80
Iris germanica Bele. Dom lichtlila, Hängeblätter stark weinrot geadert, spät-	0.00
blühend, Vorzügliche Neuheit	1.50
" Flammenschwert. Bedeutende Verbesserung der beliebten Sorte Iriskönig.	2.50
" Folkwang. Dom lichtrosa, Hängeblätter weinrot mit braun-	2100
gelber Aderung	1.50
"  Fürstin Lonyay. Dom lilaviolett, Hängeblätter weinrot, reichblühend. 120 cm hoch	0.70
llean Dom lichtlilarosa unten dunkelweinrot 60 cm	1.—
Richard II. Dom reinweiß, Hängeblätter schwarzpurpurn mit	
weißer Umrandung. Eine der allerschönsten Iris	5.—
" Rota. Dom glänzend karminrosa, Hängeblätter dunkler ge- adert	2.—
Iris sibirica Perry's Blue. Lichtblaue, große Blume auf hohem, starken Stiel.	
60—80 cm. Juni	0.70
Lilium regale. (Königslilie.) Idealsorte für jeden Garten. Schmalbelaubte, aufrechtwachsende, prächtige, großblumige Lilie. Durchmesser der einzelnen	
Blüten 15—18 cm. Reinweiß, im Schlunde kanariengelb. Im Winter ist	
eine leichte Laubdeckung empfehlenswert	2.—
Papaver orientale May Queen. Neuer Riesenmohn mit dunkellachsroten,	0.60
gefüllten Blumen	0.00
karminrosa Färbung	1.50
Dhlaw amigulata (doguscata):	
Phlox paniculata (decussata):	
Georg Stipp. Großblumia, lachsrot mit karminfarbigem Auge. Wuchs	0.00
gedrungen mit großen Dolden	0.80
Kräftig und gesund wachsend, unempfindlich gegen Regen und Sonnen-	
Mia Ruys. Niedrig, mit reichverzweigten Dolden großer, reinweißer Blumen.	0.80
Mia Ruys. Niedrig, mit reichverzweigten Dolden großer, reinweißer Blumen.	0.50
Gesund und widerstandsfähig	0.70
Paul Hoffmann. Leuchtend magenta-karminrot mit dunkler Mitte, 1 m hoch,	
Stiele und Belaubung dunkel, auffallende neue Sorte	0.80

	1 St. M.
Phlox paniculata:	
Rosenkavalier. Sehr große Blüten von kräftig rein-rosenroter Farbe.	4
Gesund und kräftig wachsend	1
	0.60
Primula hybrida Helenae Purpurkissen. Reichblühende Frühlingsprimel	0.40
von schöner purpurroter Farbe	0.60
Pyrethrum roseum hybridum Dr. Bosch. Einfachblühend, leuchtend lachs-	1.60
Pyrethrum roseum hybridum Eileen May Robinson. Sehr großblumig,	1.50
einfach, reinrosa	1.50
Pyrethrum roseum hybridum Perkeo. Von niedrigem, zwergartigem Wuchs,	1.00
ähnlich dem P. roseum nanum, aber mit leuchtend dunkelroten Blüten	1
Pyrethrum roseum hybridum Orlando. Sehr großblumig, straff aufrecht,	10.50
leuchtend karminrot	1.—
Sedum spathulatum purpureum. Braunrote Blattrosetten mit graublauem	
Hauch und gelben Blüten. Sehr wirkungsvoll	0.60
Sempervivum hybridum Alpha. In der Mitte weiß behaarte Rosetten von	0.70
Sempervivum hybridum Beta. Mittelgroße Rosetten brauner Blätter, Mitte	0.70
	0.70
Solidago hybrida Goldelfe. Mittelhoch, mit leicht übergebogenen, reich	0., 0
verzweigten Rispen zierlicher, dunkelgoldgelber Blütchen, 80 cm. August	0.80
Solidago hybrida Goldschleier. Mit pyramidalen Rispen, deren leuchtend	
goldgelbe Blütchen die Pflanze wie mit einem Schleier überdecken.	
60—80 cm	0.80
Solidago hybrida Mimosa. Bedeutende Verbesserung von Solidago rugosa	
(aspera) mit reich verzweigten, lang überhängenden Rispen goldgelber Blütchen, an italienische Mimosen erinnernd, 150 cm. September	1
Veronica hybrida Shirley blue. Kräftig wachsende, kriechende Sorte,	
dunkelblau	0.80
Veronica teucrium prostrata alba. Reinweiß	0.50
" pallida. B'äulichweiß	0.50
Viola cornuta Hansa. Beachtenswerte Verbesserung des Wermig-Veilchens,	0.10
mit edlen, reingefärbten Blumen	0.40
Viola gracilis Juwel von Eisenach. Widerstandsfähige, reichblühende Sorte, Blumen größer als die der Stammart, samtigviolett	0.60
Viola odorata Riese von Botnang. Vorzügliches großblumiges und lang-	0.00
stieliges dunkelblaues Veilchen. Reichblühend	0.50
D All	2
B. Allgemeine Sammlung von Schmuck	<b>(-</b>
and Calculational and	
und Schnittstauden.	
	St. M.
Achillea filipendulina (eupatorium) Parker's Var. Schafgarbe, goldgelb,	1 1011 1711
70.00	0.70
,, millefolium Cerise Queen. Kirschrot, 40—50 cm, Juni-September	0.40
" ptarmica grandiflora fl. pl. Perry's White. Weißgef., 60-80 cm,	0.15
Juni-September	0.40
Aconitum napellus. Eisenhut, dunkelblau, 100—150 cm, Juli-August	0.60
", lycoctonum pyrenaicum. 100—150 cm hoch mit gelbl. Blütenrispen napellus bicolor. Blau und weiß, 100—150 cm, Juli-August	0.60
Wilsonii Lichthlau 100 150 cm Sentember	0.80
Actaea. Siehe Cimicifuga.	0.00
Aetheopappus pulcherrimus siehe Centaurea pulcherrima.	
Althaea rosea plena. Stockrose in allen Farben, 200 cm, Juni-August	0.50
Anchusa italica var. Dropmore. Ochsenzunge. Meterhohe pyramidale	
Anchusa italica var. Dropmore. Ochsenzunge. Meterhohe pyramidale	
Anchusa italica var. Dropmore. Ochsenzunge. Meterhohe pyramidale Rispen, dunkelblau. Juni—Juli . Anchusa myosotidiflora. Kaukasus-Vergißmeinnicht, blau, 50—60 cm, Mai	
Anchusa italica var. Dropmore. Ochsenzunge. Meterhohe pyramidale Rispen, dunkelblau. Juni—Juli	0.60 0.70
Anchusa italica var. Dropmore. Ochsenzunge. Meterhohe pyramidale Rispen, dunkelblau. Juni—Juli .  Anchusa myosotidiflora. Kaukasus-Vergißmeinnicht, blau, 50—60 cm, Mai Anemone japonica. Neuheiten siehe vorn unter Abt. A  Honorine Jobert. Reinweiß, 60—100 cm, Herbst .  Prinz Heinrich Dunkelses 50—60 cm Herbst .	0.60 0.70 0.60
Anchusa italica var. Dropmore. Ochsenzunge. Meterhohe pyramidale Rispen, dunkelblau. Juni—Juli .  Anchusa myosotidiflora. Kaukasus-Vergißmeinnicht, blau, 50—60 cm, Mai Anemone japonica. Neuheiten siehe vorn unter Abt. A  Honorine Jobert. Reinweiß, 60—100 cm, Herbst .  Prinz Heinrich. Dunkelrosa, 50—60 cm, Herbst .  Wirhelwind Peinweiß halbasfüllt 60—100 cm, Herbst .	0.60 0.70 0.60 0.70
Anchusa italica var. Dropmore. Ochsenzunge. Meterhohe pyramidale Rispen, dunkelblau. Juni—Juli .  Anchusa myosotidiflora. Kaukasus-Vergißmeinnicht, blau, 50—60 cm, Mai Anemone japonica. Neuheiten siehe vorn unter Abt. A  Honorine Jobert. Reinweiß, 60—100 cm, Herbst .  Prinz Heinrich. Dunkelrosa, 50—60 cm, Herbst .  Wirbelwind. Reinweiß, halbgefüllt, 60—100 cm, Herbst .  wirbelwind. Reinweiß, halbgefüllt, 60—100 cm, Herbst .  Wirbelwind. Waldanemone, großblumig, reinweiß,	0.60 0.70 0.60 0.70 0.70
Anchusa italica var. Dropmore. Ochsenzunge. Meterhohe pyramidale Rispen, dunkelblau. Juni—Juli .  Anchusa myosotidiflora. Kaukasus-Vergißmeinnicht, blau, 50—60 cm, Mai Anemone japonica. Neuheiten siehe vorn unter Abt. A  Honorine Jobert. Reinweiß, 60—100 cm, Herbst .  Prinz Heinrich. Dunkelrosa, 50—60 cm, Herbst .  Wirbelwind. Reinweiß, halbgefüllt, 60—100 cm, Herbst .  silvestris grandiflora. Waldanemone, großblumig, reinweiß,	0.60 0.70 0.60 0.70 0.70

Aquilegia chrysantha, Akelei. Goldgelb, 60—70 cm, Juni-Juli	0.50 0.50
,, vulgaris hybrida. Weiß, lila, rosa, purpurn, 60 – 80 cm, Juni-Juli .	0.50 0 40
Aralia cachemirica. Aralie, dekorative Blattstaude, 150 cm, August-Sept  ", californica. Sehr dekorative Blattpflanze, 200 cm, September .  Artemisia vulgaris alba (syn. lactiflora). Edelraute, milchweiß, 100—150 cm,	0.80
August—September  Aruncus silvestre var. Kneiffii. Geißbart (syn. Spiraea aruncus). Weiß,	0.60
mit zierlichem Laubwerk, 60 cm	1.25
Frühjahrs-Astern:	
Aster alpinus. Siehe unter Abteilung C hinten.  " subcoeruleus. Hell- und dunkel-violett. 40—50 cm, Mai—Juni  " yunnanensis und lichiangensis siehe unter Abteilung A, Neuheiten.	0.50
Sommerblühende Stauden-Astern:	
Aster acris (Galatella acris). Purpurblau, sternförmig, 40—50 cm, August Aster amellus. Neuere Sorten siehe unter Abteilung A vorn.	0.60
,, ,, Framfieldii. Leuchtend stahlblau, 50 cm, August-September ,, ,, ,, Imperator. Dunkel lavendelblau, 50 – 60 cm, AugSeptbr.	0.80
", Leuchtfeuer. Lilarot, 50 cm, August-September	2.— 0.80
,, Schöne v. Ronsdorf. Sehr großbl., lilarosa, 50 cm, AugSept.	
" Ultramarin. Dunkelultramarin, 60 cm, September-Oktober	0.80
", ptarmicoides. Kleinblumig, weiß, 40—50 cm, August	
Herbstblühende Staudenastern (großblumige):	
Aster novi-belgii:	0.70
Genoveva. (H. J.). Weiß, eigenartig schön, 1 m, September	0.60 0.50 0.60 0.70 0.50 0.50 0.50
Kleinblumige Herbstastern:	
Aster cordifolius Ideal. Lila, 60—100 cm, September-Oktober  Sprühlicht. Weißlich lila, 60—100 cm, Oktober-November weiß, 1 m, September-Oktober	0.70
Andere Herbstastern:	
Aster laevis. Lavendelblau, 150 cm, Oktober-November	0.50
novae angliae Constanze. Violettblau, 150 cm, Oktober Lill Fardell. Karminrosa, 150 cm, Oktober pulcherrimus. Licht lila, großblumig, 150 cm, Oktober albus. (H. J.). Weiß, großblumig, 150 cm, Oktober	0.60
Astilbe hybrida (Spierstaude), syn. Astilbe Arendsi	:
Vorzügliche Schmuck- und Schnittstauden für jeden Garten. Neueste Sorten siehe vorne Abt. A.	
<b>Deutschland.</b> Beste weiße Treibsorte. <b>Rheinland.</b> Leuchtend rosakarmin. <b>Emden.</b> Cattleyenrosa. <b>Möve.</b> Aehnlich der Rheinland, aber später blühend. Diese 4 Sorten sind auch zum Treiben gut geeignet! Alle 4 Sorten: 1 Stück	0.70




Astilbe hybrida (Arendsii) »Weiße Gloria«.
Schönste aller weißblühenden Astilben.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	Astilbe	hybrida	syn.	Arendsii)	:
---------------------------------------	---------	---------	------	-----------	---

Amethyst. Tief violettpurpur Bergkristall. Schneeweiß, spätblühend. Juli-August Diamant. Schneeweiß, frühblühend. Anfang Juli Granat. Leuchtend dunkelkarmin Hyazinth. Leuchtend lilarosa Rubin. Dunkelkarmin	
Brunhilde. Cremerosa mit lichtlila, Juli-August, 80 cm Ceres. Lilarosa, 60 cm, Juli-August Gloria. Leuchtend dunkelrosa, 50—60 cm, Juli Gunther. Leuchtend hellrosa, 80 cm, Juli-August Juno. Leuchtend purpurrosa, 80—100 cm, August Kriemhilde. Lachsrosa, 80 cm, August Lachskönigin. Lachsrosa, geperlt, 80 cm, Juli-August Opal. Lichtlila, 1 m, Juli-August Siegfried. Dunkelkarminrosa, 80 cm, August Vesta. Hell lilarosa, 80 cm, Juli-August Walküre. Hell lachsrosa, 1 m, Juli-August Walküre. Hell lachsrosa, 1 m, Juli-August ,, grandis. Weiß, 100—150 cm, Juli ,, japonica Queen Alexandra. Rosa, 40-50cm, Juli-Aug.	0.60
Astilbe Taquetii. Ausläufer treibende Sorte mit fedrigen Blütenrispen von lilarosa Farbe, 60—80 cm, August	0.70
Bergenia Stracheyi alba. Weiß, 25 cm, April	1.—
Boltonia latisquama (syn. Diplostephium). Weiß, 150 cm, September Caltha palustris fl. pl. Dotterblume, goldgelb, gefüllt, 30 cm, Mai Campanula glomerata superba. Tiefblau, 50 cm, Juni-Juli persicifolia alba grandiflora. Weiß, 50—60 cm, Juni coerulea grandiflora. Großblumig, blau, 50—60 m, Moerheimii. Weiß gefüllt, 50—60 cm, Juni Die Fee. Hellblaue Glockenblume, 50—60 cm, Juni Pfitzeri. Dunkelblau, gefüllt, 50—60 cm, Juni	0.50 0.70 0.60 0.50 0.50 0.80 0.70 0.80

					1 St. M.
Centaure	a montana grdfl. Blau, 40-50 cm, Mai				0.50
"	" alba. Weiße Bergkornblume, 40-50 cm,	Mai			0.50
"	macrocephala. Gelb, 100-120 cm, Juni-Juli, wertvolle S	chni	ttblu	me	0.70
"	pulcherrima (syn. Aetheopappus). Kaukasus-Korni	olum	e, ro	sa,	0.70
	60—80 cm, Juli		*		0.70
"	ruthenica. Schwefelgelb, 150 cm, Juni-Juli				0.60
Chelone	obliqua alba. (Bartfaden.) Weiß, 50 cm, Juli-August				0.60



Eine Gruppe blühender Freiland-Chrysanthemum in meinem Schaugarten.

Chrysanthemum indicum flore pleno. Winterharte Gartenchrysanthemum, prachtvolle Schnitt- u. Schmuckstauden. Blütezeit Sept.-Okt., oft auch bis November. Bei Herbstpflanzung sind die Pflanzen leicht zu decken.

Altgold (Pompon). Prachtvolle Gruppensorte, gold-bronzegelb, 50 cm Anastasia (Pompon). Reichblühende, dunkelkarminrosa Gruppensorte, 50 cm

Belle mauve. Silberlila, großblumig, 80 cm Black Douglas. Spätblühend, dunkelsamtrot, 50 cm

Climax. Leuchtend kanariengelb, Schnitt- und Gruppensorte, 50 cm

Dainty. Mittelgroße Blume, dunkelrosa, 70 cm

Edelstein. Mittelgroß, weiß

Goldperle (Pompon). Goldbraun, mittelfrüh, 70 cm

La Triomphante. Rosa, langstielige Massenschnittsorte Mad. Lyobard. Niedrig, reinweiß, großblumig.

Mägdeblick. Mittelfrüh, samtigrotbraun. Vorzügliche wetterharte Sorte

Normandie. Reichblühend; wertvollste rosablühende Sorte, 80 cm

Normandie, eigener Sport, bronzefarbig. Besitzt alle Vorzüge der Stammsorte

Pluie d'argent. Frühblühend, reinweiß, 50 cm

Purpur. Reichblühend, vorzüglich zum Schnitt, purpurn, 80 cm

Ruby King. Sammet rotbraun, 60 cm Satin rose. Kräftig rosa, großblumig, 70 cm, spätblühend Source d'or. Goldbronzefarbig, 80 cm. Vorzügliche Sorte

Toulousaine (Pompon). Reichblühend, rotbraun, 60 cm

White Croutts (Pompon). Reinweiß, 50 cm

Zwergsonne (Pompon). Leuchtend gelber Sport v. »Altgold«. Sehr wertvoll, 50 cm

Alle Sorten je Stück: Starke Pflanzen 0.70, Junge Pflanzen 0.40

	1 St. M.
Chrysanthemum (syn. Leucanthemum) maximum (Wucherblume)	0.40
Triumph. Reinweiß, 60 cm, Juli-August	0.60
Vorzügliche Schnittsorte	0.70
,, maximum Ophelia. Rahmfarben. Sehr schön .  Cimicifuga japonica (Actaea). Weiß, 1 m, August-September	
,, acerina (syn. Pityrosperma). Weiß, 50 cm, September	0.80
racemosa. Weiß, 120-150 cm, Juli-August	0.80
Clematis (Waldrebe) heracleaefolia var. Davidiana. Hellblaue Hyacinthen glocken-Blüten, 80 – 100 cm, August	1.50
recta. Weiß, 1 m, Juni-Juli	1
" recta fl. pl. Weiß gefüllt, 50—80 cm, Juni-Juli	. 2.—
Convallaria multiflora siehe Polygonatum multiflorum!	
Coreopsis (Mädchenauge) grandiflora. Goldgelb, 60—80 cm, Juli-Okt.	0.40
", verticillata. Hellgelb, 50 cm, Juli-Oktober	
Delphinium hybridum, Rittersporn:	
Neuheiten siehe vorn unter Abt. A.	
	. 1.—
	. 1.— . 0.70
Wilh. Storr. Himmelblau mit rosa Schattierung, einfach	. 0.80
	. 1.—
Gemischte Hybriden in prächtigem Farbenspiel	. 0.50
Dictamnus albus (Diptam). Weiß, 60—80 cm, Juni	. 0.80
", var. rubra. Rosenrot, 60—80 cm, Juni	. 0.80
Mai-luni	. 0.70
Digitalis purpurea var. gloxiniaeflora. (Fingerhut.) Weiß, rosa, rot	0.50
Diplostephium siehe Boltonia.	
Doronicum caucasicum. Goldgelb, 40 cm, April	0.50
Echinacea purpurea siehe Rudbeckia!	
Echinops ritro (Kugeldistel). Blau, 150 cm, Juni-Juli	. 0.60
" sphaerocephalus. Grauweiß. 150 cm, Juni-Juli	
,, mesagrande speciosus. Tiefblau, 50 cm, Juni-Augus	0.60
" speciosus grandiflorus hybr. Hell- v. dunkellila, 50 cm, Juni-Augus " speciosus semiplenus. Reizende, halbgefüllt blühende Sorte,	0.60
lavendelblau, 50 cm, Juni-Juli	. 0.60
,, superbus major. Hell lila, großblumig, 60 cm, Juli-September Eryngium alpinum (Edeldistel). Silberblau, 50-80 cm, Juni-Juli	. 0.60
"Bourgatii Silberweiß, 40 cm, Juni	. 0.80
,, planum. Stahlblau, 1 m, Juli-August	. 0.50
" hybrid. Juwel. Dunkelstahlblaue Blütenstände	. 0.80
Eupatorium purpureum (Walddost). Purpurrosa, 11/2-2 m, Juli-August	. 0.80
<b>Euphorbia</b> (Wolfsmilch) <b>epithymoides</b> (syn. <b>polychroma</b> ). Leuchtend gold gelb, 40 cm, Juni-Juli	A 775.A
Filipendula hexapetala (Spierstaude) (syn. Spiraea filipendula fl. pl.). Weif	3
gefüllt, 50 cm, Juli ,, palmata elegans (syn. Spiraea palmata). Zart rosa, 80 cm	. 0.60
Juni-Juli	F - 100
,, ulmaria fl. pl. (syn. Spiraea ulmaria). Weiß gefullt, 80 cm	0.60
Juni-Juli	. 0.70
Funkia siehe Hosta.	
Gaillardia (Kokardenblume) aristata hybrida (syn. G. grandiflora). Gell und rot, in herrlichstem Farbenspiel, 50—60 cm, Juni-Oktober	
Galega bicolor Hartlandii (Gaisraute). Reizende lila und weiße Schmetter	-
lingsblüten, 100 cm, Juni-August	. 0.70
Blüten, Juni-Juli	. 0.60

	1 St. M.
Geum (Nelkenwurz) coccineum Mrs. Bradshaw. Scharlach, 50 cm, Juni-Sept	. 0.50
,, montanum Heldreichli magnificum. Hellorange, 60 cm, Mai-Juni Gunnera manicata. Herrliche Blattpflanze von riesigen Ausmaßen. Verlang	. 0.00
reichlich Wasser im Sommer, im Winter dagegen Trockenheit und Deckung	
Je nach Größe	is 5.—
Harpalium siehe Helianthus.	. 1
Helenium (Sonnenbraut) autumnale Gartensonne. Goldgelb, 150 cm	
August-September autumnale grandicephalum Julisonne. (H. J.) Goldgelb mi	A 18
,, autumnale grandicephalum Julisonne. (H. J.) Goldgelb m braunroter Schattierung, 1 m, Juli-September	. 0.60
" autumnale pumilum magnificum. Goldgelb, 60 cm, Juli-Sept	0.40
" Bigelowii. Goldgelb mit schwarzer Mitte, 80 cm, Juni	. 0.60
"  Hoopesii. Orange. 60 cm, Mai-Juni  hybridum Goldene Jugend siehe unter Neuheiten.	. 0.50
hybridum Wesergold siehe unter Neuheiten.	
Helianthus rigidus (syn. Harpalium) Daniel Dewar. Goldgelb, 1 m. Juli-Sept	The second secon
Helianthus salicifolius. Schlanke Sonnenblume mit weidenartig hängender	. 0.50
lanzettlichen Blättern und kleinen gelben Blütchen, 1—2 m, Oktober	,
Prächtige Schmuckstaude für Einzelstellung	. 0.70
Helleborus hybridus (Nieswurz). Rosa-purpur, 30—40 cm, Februar .	. 0.90
", Frau Irene Heinemann. Rosa mit purpurn. Punkt "Febr ", niger (Christrose). Weiß, 30 cm, Dezember-März	
" major. Weiß, größer, 30 cm, Dezember-März .	. 2.—
,, praecox. Weiß, 40 cm, Oktober-Dezember	. 3.—
Hemerocallis (Taglilie) aurantiaca. Echt, orange, 75 cm, Juli-August .  citrina. Zitronengelb, süß duftend, 75 cm, Juli-August .	. 0.90
,, Dumortieri. Orangegelb, 50 cm, Mai-Juni	. 0.60
,, flava. Goldgelb, 70—80 cm, Mai-Juni	. 0 50
fulva. Orange, 75 cm, Juli	. 0.50 t 1.—
hybr. Aureole. Großblumig, dunkelorange, 80 cm, Juli .	0.60
" Middendorffii. Orangegelb, 50 cm, Mai-Juni	. 0.60
Heracleum (Bärenklau) Mantegazzianum. Weiß, 2 m, Juli-August .  Heuchera brizoides gracillima superba (Purpurglöckchen). Rosa, zierlich	. 0.80
,, 50 cm, Juni-Juli	. 070
" sanguinea alba. Weißblühende Abart von H. sanguinea. Jul	
,, sanguinea maxima. Scharlach, 40 cm	. 0.70
Morgenröte. Rosa mit weiß, 50 cm	. 0.70
,, rubescens. Weißlich-rosa, 60 – 80 cm	. 0.70
Hosta (syn. Funkia) (Funkie) Fortunei glauca. Stahlblaue Belaubung, 40 cm, Jul	. 0.50 i 0.70
" Fortunei robusta. Stahlblaue Belaubung, starkwachsend, 50 cm, Jul	i 0.80
" ovata albo-marginata. Weißberandete Belaubung, 30 cm .	. 0.60
" ovata aureo-variegata. Goldbunte Belaubung, 30 cm	
" robusta elegans fol. var. Kräftiger als vorige, 40 cm	. 0.70
" Sieboldiana hybrida. Lila, 50 cm, Juli	. 0.70
Hypericum calycinum (Hartheu). Gelb, großblumig, 40 cm, Juni-September Incarvillea (Staudengloxinie) Delavayi. Karminrosa, 70 cm, Mai-Juni .	0.70
Inula glandulosa grandiflora. Mit sehr großen orangegelben Strahlenblüter	1
50 cm, Mai-Juni	0 40
Inula (Alant) Royleana. Orangegelb mit schwarzer Mitte, 80 cm, Juli-Augus Iris (Schwertlilie) germanica:  Donna Maria. Lichtlila-weiß	
Darius. Chromgelb mit lila Dr. Bernice. Purpur und or	
Elsie. Hellblau Her Majesty. Nelkenrosa	
Florentina. Perlmutterfarbig Homer. Lavendelblau Hector. Hell kupferfarbig Iriskönig. Goldgelb und br	aunrot.
Lord Gray. Kupferfarbig Mad. Chereau. Weißu. lavend	
Maori King. Gelb mit braunrot Mad. Paquette. Purpurrosc	1
Mithras. Lichtgelb mit purpur Mad. Patti. Lichtgelb und v Mrs. H. Darwin. Weiß, lila geadert Prinzess Viktoria Luise. Sci	
Mrs. H. Darwin. Weiß, lila geadert Prinzess Viktoria Luise. Sch Mrs. Reuthe. Weiß, bläulich geadert gelb und pflaun	
Pallida perfecta. Violett Rheinnixe. Weiß und veilch	enblau
Poiteau. Weiß und dunkelviolett Riese von Cönnern. Hellb	The second secon
Obige Sorten je 0.50 M. Obige Sorten je 0	./ U M.



Gruppe riesenblumiger **Iris Kaempferi** (japanische Schwertlilien) in den Anlagen meiner Gärtnerei.

Prachtvolle eigene Züchtungen, 1 St. 1.50 M., 10 St. 14.– M.

Üebrige Sorten siehe weiter unten!

## Verschiedene Iris-Arten und Hybriden.

Iris Gueldenstaedtiana. Lichtblau, 120 cm, Juli 0.8	0
" Monnieri. Dunkelgoldgelb, 120 cm, Juli	
" ochroleuca gigantea. Reinweiß, 120 cm, Juli 0.8	
" ochroleuca gigantea. Reinweiß, 120 cm, Juli 0.8 " sulphurea. Licht schwefelgelb, Juli 0.8	
Iris Kaempferi (japanische Pracht-Schwertlilien).	-
Prachtvolle japanische Sorten in allen Farben, 50—100 cm hoch, Juli . 1.2	0
Prachtvolle deutsche Sorten in allen Farben, 50—100 cm hoch, Juli . 0.8	
Snow Queen Schneeweiß 1 m luni-luli	
mallide conformate Double State Distant La Heller Construction 16	
,, palitaa variegara. Buntbiattrig, Blute helibiau, 30 cm, juni 1.3	
" pseudacorus. Gelbblühende Wasser-Schwertlilie, 1 m, Juni 0.4	100
"	
" sibirica superba. Dunkelblau, 1 m, Juni	100
trigonocarpa. Veilchenblau, großbl., 60 cm, Mai-Juni 0.7	U
Kniphofia (syn. Tritoma) (Fackellilie) uvaria grandiflora. Korallrote Blüten-	
fackeln, 1 m, August-September. Verlangt Winterschutz 0.8	0
Lavandula (Lavendel) siehe unter Abt. C.	
Leucanthemum maximum siehe Chrysanthemum maximum.	_
Liatris graminifolia dubia (Prachtscharte.) Karmin, 80 cm, Juli-August . 0.8	
Lilium candidum. Weiße Gartenlilie, 1 m, Juni-Juli 0.5	0
Lilium regale siehe unter Abt. A.	
Linum narbonnense. Niedriger, buschige Pflanzen bildender Lein, den ganzen	
Sommer mit hellblauen Blüten geziert. Belaubung nadelartig, blaugrün.	
60 cm. Verlangt Winterschutz	-
Lupinus (Lupine) polyphyllus. Blau, 1 m, Juni-August 0.5	0
", albus. Weiß, 1 m, Juni-August 0.5	0
,, roseus. Rosa, 1 m, Juni-August 0.7	0
", albus. Weiß, 1 m, Juni-August 0.5 ", roseus. Rosa, 1 m, Juni-August 0.7 Lychnis chalcedonica (Brennende Liebe). Scharlach, 1 m, Juni-Juli 0.5	0
,, alba. Abart mit weißen Blüten 0.5	0
" viscaria splendens fl. pl. Gef. Pechnelke, siehe Viscaria viscosa fl. pl.	
11. STATE OF THE PROPERTY OF T	

	1 St. M.
Lythrum virgatum Rose Queen (Weiderich). Zur Bepflanzung von Ufern und für Rabatten. Schlanker, zierlicher Wuchs. Lachsrosa Blüten, 80—100 cm	
Macleya cordata (syn. Bocconia japonica). Federmohn. Herrliche Blatt- und	0.50
Macleya cordata (syn. Bocconia japonica). Federmohn. Herrliche Blatt- und Dekorationsstaude. Blüten weiß. 2—3 m hoch. Juli-August	0.70
Monarda didyma (syn. Kalmiana). Bienenbalsam. Violettrot, 60—80 cm .  Cambridge Scarlet. Scharlachrot, 80 cm. Mai-Sept	0.60
Myosotis palustris Perle von Ronnenberg (Vergißmeinnicht). 30 cm. Mai-	0.60
September  Oenothera (Nachtkerze) glauca (syn. glabra). Goldgelb, 40 cm. Juni-Juli .	0.40
	0.50
" missouriensis (syn. macrocarpa). Großblumig, leuchtend gold- gelb. 20 cm, kriechend	0.60
Onopordon (Anatoldistel) bracteatum. Silberweiße Belaubung, Blüten pur-	0.50
purn, 2 m, August-September, zweijährig Paeonia albiflora sinensis fl. pl. (Gefüllte Pfingstrosen). 60-100 cm, Mai-Juni	0.50
Alba magna rosea. Rosa, Spitzen weiß	1
	1.20
Bicolor. Außen mattrosa, innen cremefarben	1.20
Buykii. Nelkenform, zartrosa, Mitte lachsfarben	1.20
Clarissa. Schale rosa, Füllung silbrigrosa	2.—
	2.—
	2
Humei carnea. Atlasrosa, riesenblumig	1.50
	2.50
	1.20
Mad.Charles Leveque. Zart fleischfarbig, Neikenform. Duffend	1.50
Mad. Forel. Seidenrosa mit lila Schein	1.50
	1.50
Prinzess Charlotte. Zartrosa, spätblühend	1.20
	2.50
	1.50
Reine des Roses. Rosa, Mitte gelblich schattiert	2
Rubra Triumphans. Tief dunkelrot	1.50
	1.50



Einzelblüten von Paeonia Mad. Charles Lévêque. Eine der schönsten Pfingstrosen.

Paeonia albiflora	sinensis	fl. pl	. (Gefüllte P	fingstros	en).	60	100	m, M	ai-Ju	ıni	
Triumphans	ganday	ensis.	. Zart lila,	hellgelb	und	lac	hsfar	ben			2.—
Versicolor.	Rosa mit	weiß	nuanciert								1.20

	1 St. M.
Paeonia albiflora sinensis fl. pl.  Victoire de l'Alma. Purpurviolett	2.—
	1.20
	1.50
Paeonia, einfachblühende, in Sorten:	
,, albiflora Celestial. Leuchtend purpurrosa	1.—
,, purpurea. Dunkelpurpurrot	1.—
,, anemonaetiora. Liet purpurn, halbaetuilt bis getuilt	1.50
" Wittmanniana hybrida. Fleischfarbig rosa bis hellockergelb .	1.50
" officinalis alba plena. Reinweiß, gef. Abart der alten Bauernrose	2.—
Papaver nudicaule (Sibirischer Mohn) Sunbeam (Zweijährig). Neue, straff- wachsende, großblumige, engl. Rasse. Weiß, gelb orange und rot,	
50-60 cm, Mai-Juli	0.50
" orientale (Türkischer Mohn) in besten Sorten, 60—100 cm, Mai-Juli:	7.10
Neue Sorten siehe unter Abt. A.	
Goliath, dunkelscharlach, Prinzess Viktoria Luise, lachsrosa (alle S	orten
Mrs. Perry, rosa Württembergia, dunkelblutrot i je St.	0.60
Peltiphyllum peltatum (syn. Saxifraga peltata). Schirmblättriger Schmuck-	
steinbrech. Prächtige Blattpflanze für Uferpartien, mit rosa Blütenrispen,	
40—70 cm, Mai	0.80
Phlox (Flammenblume). Frühjahrsblüher siehe Abt. C hinten.	
" Arendsii. Bastarde in besten Sorten, weiß, lila, lilakarmin, purpurrosa,	0.70
Mai-Juni, 40-50 cm	0.70
Phlox paniculata (syn. decussata). Neuheiten siehe vorn unter A. Folgende beste ältere und neuere Sorten sind abgebbar, jede Sorte ohne	
Preisangabe	0.50
Andenken an Wilhelm Pfitzer Hanny Pfleiderer. Rahmweißm.ke	ormin
Leuchtend karminrosa 1.— Auge, 7	
Antoine Mercier. Weiß mit lila Auge, Hans Vollmöller. Lila mit weiß	
70 cm Mitte, 6	
Baron van Dedem. Große Dolden Hindenburg. Feurigkarmesinrot, ni	edrig
scharlach-blutroter Blüten Le Mahdi. Veilchenblau, 70 cm	
Deutschland. Karmin mit dunkelrosa Loki. Lachsrosa mit Karmin, 80 c Auge 0.60 Riga. Hellkarmin, Mitte weiß, 80	
Dr. Königshöfer. Orangescharlach Rijnstroom (Rheinstrom). Dklrosa,	
mit dunklem Auge 0.80 Sieger. Karminrosa, 70 cm	
Elisabeth Campbell. Lachsrosa, 60 cm Sommerkleid. Weiß m. rot. Auge,	
Fellbacher Porzellan, niedr. für Victor Stössel. Karmin mit dunk	
Gruppen 1.— Auge, 7 Frl. v. Lassberg. Schneeweiß, 70 cm Wala. Blendend weiß, 50 cm	U cm
Frl. v. Lassberg. Schneeweiß, 70 cm Wala. Blendend weiß, 50 cm Garteninspektor Krauss. Reinlila, Württembergia. Niedrig, leuch	tend
60 cm karmi	
Phlox maculata hybr. Alpha. Mittelhoch, mit langgestreckten Rispen.	
Lilarosa mit dunklem Auge, 1 m, Juli-August	0.50
Lilarosa mit dunklem Auge, 1 m, Juli-August	0.50
Physalis Franchetii (Judenkirsche). Rote Früchte, 50 cm 10 Keime	0.70
Physostegia (Staudenheide) virginiana compacta rosea. Gedrungen, rosa	0.50
virginiana grdfl. alba. Weiß, 80 cm, Juli-August	0.50
Phytolacca decandra (Kermesbeere). Weiß, mit Rispen schwarzer Beeren-	
früchte an rötlichen Stielen, 100-150 cm, Juli-August	0.80
Platycodon grandiflorum Mariesii (syn. Wahlenbergia). Mit großen	
schalenförmigen, dunkelblauen Glockenblumen, 50 cm. Juli-August	0.70
Polemonium (Himmelsleiter) Richardsonii. Himmelblau, 40 cm, April-August album. Reinweiß, 40 cm,	06,0
	0.60
April-August	0.00
schattenpflanze mit hängenden, grünlich-weißen Blüten, 50 cm, Mai-Juni	0.40
Polygonum alpinum (Knöterich). Weiß, 50 cm, Juni	0.70
" bistorta. Rosa, 60 cm, Juni	0.50
,, polystachium. Rosa-weiß, 150 cm, September-Oktober	0.60
gelb, orange bis tief mahagonifarben, 40-50 cm, Juni-Juli, in folgenden	
Sorten: Wm. Rollisson, Vulcain, E. R. Cuttler, Le Dante, Louis van	
Houtte, Zingari, Arc-en-ciel, Nerissa, Drap d'or v. Mme. Rouillard,	
je Sorte	The same of the sa
Potentilla nepalensis Miss Willmott. Karminrosa, Juni-September, 40 cm	0.60


Primula "	Bulleyana. Bullesiana. denticulato	<ol> <li>Violett, 3</li> </ol>	b, 40 cm, Hybriden 0 cm, Ap Veiß, 30 <b>riana.</b>	ril-Mai	, Kor	ofpri	mel					0.40
	japonica.	April-Mai Karmin, 50	cm, Mai-J	uni	леп,	we		esta	,		cm,	0.60
	en Primelsort						_					
Pyrethru		<b>hybridum</b> te Sorten in w -Juli und Se	eiß, rosa,	karmin	, blu	trot,	lila,	lilard	sa, g	jelbli	ich-	
Du	ke of York.	Dunkelblut	rot, anem	onenb	lütig							0.80
G.	T. Watkins.	. (H. J.) Ko	rminrot, g	gefüllt					4			0.80
Gre	ete Prehn.	(H. J.) Karr	minrosa, o	inemoi	nenb	lütig						0.80
Jai	nes Kelway	/. Einfach, d	dunkelblut	rot								0.80
Lor	d Derby.	Einfach, leuch	ntend rot									0.80
No	n plus últre ktant. Grof	<ol> <li>Zartrosa,</li> </ol>	gefüllt			4						0.80
Sex	ctant. Grof	3blumig einf	ach, karm	inrosa			4					0.80
Lor	d Roseberr een Mary.	y. Dunkelb	lutrot, get	füllt								1
Qu	een Mary.	Zartrosa, g	efüllt .									1.—
Yve	onne Cayeu	x. Elfenbe	infarben,	gefüllt								1.—
Rodgers	ia (Schaublat podophy ia (Sonnenhu	t) aesculifo	olia. Ros	aweiß,	. 1 m	1. Ju	ni- Ju	ili				1.20
//	nitida H	erbstsonne	Goldar	elb 1	50-	m	Ser	tem	per-C	Oktob	og.	0.60
	purpure	a (Echinace	(Stache	lkonf).	Ros	arot	1.5	0 cm.	Iuli	-Aua	ust	0.80
"	po.po.c.	perfecta.	Schöner	als ve	rige	0101			100	-		1.—
",	speciosa	(syn. Newn										
												0.50
Salvia r	Juli-Ser i <b>ngens.</b> Gro	ßbl., Salbeid	art mit he	ellblau	en L	ippe	nblü	iten,	50-	-60	cm,	
	-August . ja peltata :									*		0.70
Scabiose	(Skabiose)	caucasica.	Himmelt alba.	olau, 6	0-70	cm		uli	,			0.70



Niedrige und halbhohe **Blütenstauden** im **halbschattigen Felsengarten** meiner Anlagen.


1-1

	_	
		1 St. M.
Sedum spectabile (Fetthenne). Violettrosa, 40 cm, September		0.40
,, atropurpureum. Purpurkarmin, 40 cm, September		0 50
Senecio clivorum Orange Queen (Kreuzkraut). Leuchtend orangegelb,		0.60
Senecio clivorum Orange Queen (Kreuzkraut). Leuchtend orangegelb,		
150 cm, Juli-Aug. Für feuchte Stellen und Uferbepflanzu		1
" Othello. Blüten dunkelorange, Blätter beim Austreibe	en	
dunkelpurpur, später schwarzgrün. 100-120 cm, Juli-A	ug.	1.—
(Zwei prächtige Dekorationsstauden.)		
Solidago (Goldrute) rugosa (syn. aspera). Feinverzweigt, goldgelb, 120	cm	
August-September		0.50
Gattingeri. Hellgelb, 80 cm, September-Oktober		0.50
" Shortii. Goldgelb, 150 cm, August-September		0.50
" virgaurea nana. Goldgelb, 40 cm, August-Oktober		0.50
" neue Sorten siehe vorne unter A.		
Spiraea (Spierstoude) Aruncus Kneiffii siehe Aruncus silvestre.		
" filipendula fl. pl.		
" palmata elegans siehe unter Filipendula!		
" Ulmaria n. pi.		
venusta		
Thalictrum (Wiesenraute) minus var. adiantifolium. Gelblich, Blät		0.10
adiantumähnlich, 70 cm, Juni		0.60
,, aquilegifolium. Weiß bis purpurviolett, 80 cm, Juni-Juli .		
,, dipterocarpum. Purpurrosa, 1 m, Juli-August		
" glaucum. Schwefelgelb, 1 m, Juni-Juli		0.70
Tritoma siehe Kniphofia!		
Trollius (Trollblume). 40-70 cm, April-Mai blühend.		0.00
,, caucasicus Orange Globe. Großblumig orange	-	
" hybridus Canarybird. Kanariengelb, 50 cm		0.80
" Earliest of All. Orangegelb, früh		0.80
" Goldquelle. Großblumig, gelborange		1.20
" " Goliatn. Golagelb, noch		1
" " Hellos. Keingelb		1
Goliath. Goldgelb, hoch Helios. Reingelb Lichtball. Großblütig, orangegelb Newry Giant. Hellgelb, 60 cm, spätblühend		1
" Newry Glant. Heligelb, ou cm, sparblunena		1.50
" Orangekönig. Leuchtend orange " praecox. Neue, frühblühende Hybriden eigener Züchtu		1.20
", praecox. Neue, frunblunende Hybriden eigener Zuchtu	ing	0.70
,, Hamelner Hybriden, in prächtigem Farbenspiel		0.70



Trollius hybridus in meinem Schaugarten.

				1 St. M.
Veratrum nigrum (Schwarzer Germer). Dunke	Ipurpur, 1	m, Juli		. 1.—
Viscaria viscosa splendens fl. pl. (Lychnis v Pechnelke, magentarot, 30 cm, Mai—Juni				. 0.50
Yucca filamentosa (Palmlilie). Weiße Glocken, pflanze mit pyramidalen Blütenschäften		ust. Präc	100	zel- . 1.50



Blühende Cyclamen europaeum im schattigen Felsengarten meiner Gärtnerei.

## C. Niedrig bleibende Stauden

für Einfassungen, zur Vorpflanzung, zum Verwildern.

Felsenstauden für Trockenmauern, Grotten usw.

Acaena (Stachelnüßchen) microphylla. Kriechend, bräunliche Belaubung, purpurne Samenköpfchen, 10 cm, August	0.40 0.40
Acantholimon glumaceum (Statice Ararati). Igelpolster, rosenrot, 15 cm, Juli Achillea (Schafgarbe) tomentosa. Goldgelb, Juli, 20 cm, graugrüne Belaubung Ajuga (Günsel) reptans fol. multicoloris. Blau, Mai, 10 cm, kriechend, Be-	0.80 0.50
laubung rotbraun und gelb gefleckt	0.40
chen und gelben Blüten. 10 cm, Mai-Juni	0.50 0.50 0.30 0.40 0.50
Arabis (Gänsekresse) alpina. Weiß, 30 cm, März-April	0.30 0.40 0.40
Arenaria grandiflora (Sandkraut). Niedrige moosartige Polster mit weißen Blütchen im Juli. 10 cm	0.50
,, montana. Stärker wachsend, kriechend, mit blendend weißen Blüten, Mai-Juni. 10 cm	0.50
Armeria (Grasnelke) maritima var. Laucheana (splendens). Rosenrot, 15 cm, Polster, Mai-August	0.30
" maritima alba. Niedrig, mit reinweißen Blütenköpfchen, 10 cm, Mai-August	0.30
Asarum europaeum (Haselwurz). Kriechend, immergrüne Schattenpflanze . Asperula odorata (Waldmeister). Weiß, 20 cm, Mai	0.40

1:	St. M.
	0.40
" " albus. Weiß, 15 cm, Mai-Juni	0.50
" superbus. Großblumig, lila, 20 cm, Mai-Juni	0.50
Astrantia carniolica (Sterndolde). Zierliche Sterndolde, Juni	0.60
doltaidag Dr. Mulas Lauchtand dunkalvialatt graßhlumia Anvil	0.40
Lavender Lavendelblau 15 cm April	0.50
	0.40
,, Leichtlinii Crimson. Großblumig, leucht. rot, 15cm, April	0.50
", Moerheimii. Zartrosa, 15 cm, April	0.50
American Develophers 10 am April Daiseanda Vissan bildand	
,, tauricola. Dunkelblau, 10 cm, April. Reizende Kissen bildend . (	0.40
Alle Aubrietien sind reizende Polsterpflanzen für sonnige Stellen an Trocken- mauern usw.	
Calamintha alpina siehe Satureia!	
Caltha palustris fl. pl. siehe unter Abteilung B.	
	0.50
	0.50
Destanda Indiana (manalla) Hallalan 15 Mai Lai	0.50
	0.50
	0.50
Carlina (Silberdistel) acaulis. Silberweiß, 20 cm, Juli-September	0.60
	0.40
Ceratostigma plumbaginoides (Plumbago Larpentae) Bleiwurz. Kobaltblau,	
	0.10
gigantea (Fortin). Doppelt so große Glocken	0.10
	0.30
Cotula squalida. Rasenbildend, 5 cm	0.30
Cyclamen europaeum (Winterhartes Alpenveilchen), Rot, 15 cm, Aug-Sept.	0.40
Je nach Stärke	0.00
roten Blüten, 15—20 cm, Mai-Juni	0.50
roten Blüten, 15—20 cm, Mai-Juni	
Felsennelke, lockeren Rasen bildend, 20 cm, Juni-Juli	0.50
,, deltoides Brillant. Lockere Rasen bildend, m. leuchtend karminroten	2.50
Blütchen, 20 cm, Juni-Juli	0.50



Teilansicht eines halbschattigen Felsengartens in den Anlagen meiner Gärtnerei.

1 St.	M.
Dianthus deltoides splendens. Schwarzgrünes Laub mit dunkelkarminroten	
	50
	40
그는 그들은	40
그는 그들은 그는	40
	30
	40
Dicentra (syn. Dielytra) eximia (Tränendes Herz). Rosablühend, niedrig,	50
	50
	80
Duchesnea indica (Indische Erdbeere). Rankend, gelb, Scheinbeere rot,	-
Mai-September (syn. Fragaria indica)	30
#####################################	40
Epimedium (Sockenblume) alpinum. Rötlich violett, 30 cm, April-Mai 0.0	60
,, coccineum. Rot mit weißer Zeichnung, 30 cm, April-Mai 0.6	60
	80
	60
	60
	80
" sulphureum. Schwefelgelb, 30-40 cm, April-Mai 0.0 Erigeron glabellus alpinus. Niedriges, polsterbildendes Berufskraut mit lila	60
Sternblütchen. Juli-August, 10 cm	50
Festuca glauca. Blaugrüne Büsche bildend. Prächtiges Ziergras für Felsen-	20
	30
Fragaria indica siehe Duchesnea indica!	-
Gentiana acaulis (Enzian). Tiefblau, 15 cm. April-luni	_
" septemfida var. lagodechiana. Etwas kriechender, neuer Enzian	
von leuchtend blauer Farbe mit weißem Schlund 1.2	20
Geranium nepalense. Niedriger Storchschnabel, mit purpurnen Blüten. Juni-	
August, 20 cm	60
	50
	80
	50 50
9 pl (Coffillt blüband) Galb	20
	50
	40




Ein Quartier mit Mauer- und Felsenstauden in meiner Gärtnerei.

	St. M.
Hypericum polyphyllum (Hartheu). Zierliche, kriechende Art mit goldgelben Blüten. Für Mauern und Felspartien, 15 cm	0.50
repens. Kräftiger wachsend, sonst wie vorige	0.50
Iberis (Schleifenblume) saxatilis corifolia. Blendendweiß, 30 cm, April-Mai	0.50
" sempervirens Weißer Zwerg. Reinweiß, 25 cm, April-Mai	0.50
Iris pumila (Zwergiris) siehe vorn unter Abt. B.	
Lavandula latifolia (vera). Der echte Lavendel. Belaubung graugrün, Blüten-	
ähren lila. Für sonnige Steingärten vorzüglich, 30 – 40 cm, Juli-August	0.50
" officinalis (spica). Höher wachsend als vorige, 40—50 cm .	0.50
Leontopodium (Edelweiß) alpinum. 15 cm, Juni-August	0.50
" sibiricum. Sehr großblumig, 20 cm	0.50
Linaria alpina (Frauenflachs). Reizende kleine Alpine mit blaugrüner Belaubung und zarten violetten Blüten, 10 cm, Juni-September	0.50
Linaria cymbalaria (Leinkraut). Rankend, lila, 10 cm, Juni-September	0.50
Lysimachia nummularia (Pfennigkraut). Goldgelb, rankend, 10 cm, Juni-Aug.	0.30
Megasia siehe Bergenia vorn unter Abt. B.	0.00
Myosotis palustris (Sumpfvergißmeinnicht) Perle von Ronnenberg. Groß-	
blumig, himmelblau, 30 cm, Mai-September	0.40
Nepeta Mussini (Katzenminze). Niedrig, Belaubung silbergrau, Blütenrispen	
blau, 20 cm, Juni-Oktober	0.40
Omphalodes verna (Männertreu). Hellblau, 30 cm, April-Juni	0.40
Papaver nudicaule (Sibirischer Mohn). Weiß, gelb, orange, 25 cm, Mai-Juli	0.40
Patrinia palmata. Valerianacee für halbschattige Stellen. Die gelben Blüten	0.80
Phlox amoena (Frühjahrs-Phlox). Karminrot, 20 cm, April-Mai	0.50
,, divaricata (canadensis). Hellblau, 30 cm, April-Mai	0.50
" setacea atropurpurea. Dunkelpurpurn, 30 cm, April Mai	0.50
,, Elfe siehe unter Neuheiten Abt. A.	
,, G. F. Wilson. Hellschieferblau, 30 cm, April-Mai	0.50
" nivalis. Schneeweiß, 10 cm, April-Mai	100 mm
" stellaria. Licht violett, 30 cm, April-Mai	0.50
Plumbago Larpentae siehe Ceratostigma.	0.40
Potentilla nepalensis Miss Willmott. Karminrosa, 40 cm, Juni-September	0.60
Primula acaulis. Hybriden in schönstem Farbenspiel, 10 cm, April-Mai	0.40
municula (Aurikal) an Auricula luton. Eaht halladh duftand	0.00
20 cm, Mai	0.60
" elatior carpathica. Gelb, 20 cm	0.50
,, elatior gigantea, Hamelner Hybriden. Riesenblumige, teils sehr	
langstielige Varietäten im prächtigsten Farbenspiel	0.60
" elatior grdfi. Schöne Gartenprimel in prächtigen Farben, groß-	0.10
blumig, auch zum Schnitt wertvoll, 20 cm	0.40
" elatior grdfi. coerulea. Großblumige, blaue Gartenprimel	0.60
,, cortusoides. Rosa, auf 15—20 cm hohen Blütenstielen, Mai	0.50
hybride Lathringon 20 cm karmingaga Mai luni	0.70
", Juliae. Violettrot, 5 cm, Mai	0.50
" pubescens (Pr. auricula × Pr. viscosa). Englische Aurikeln in	1.000
allen Farben, prachtvoll, 20 cm	0.50
" rosea grdfi. Rosarot, 15 cm, Mai. Schönste Frühjahrsprimel für	0.40
feuchte Stellen	0.60
" sikkimensis. Schwefelgelbe Blüten in lockerer Dolde. 40 cm. Juni	0.70
Pyrethrum roseum hybr. nanum. 25 cm sattrosa, Mai-Juni	0.80
Ramondia myconi (pyrenaica). Gesneriacee. Rosettige Felsenpflanze für	0.00
schattige Plätze, mit tiefblau-violetten Blüten, 5—10 cm, Juni	1
Ranunculus gramineus (Hahnenfuß). Mit lanzettlichen Blättern und zitronen-	
gelben Blüten. Hübsche Pflanze für feuchte Stellen im Garten	
und Park, 25 cm hoch, Juni	0.60
Sagina subulata (Spergula pilifera). Niedrig, rasenbildend, Juni-August	0.30
", " aurea. Goldgelbe Abart der vorigen	0.40
bung und schwefelgelben Blütenköpfchen. 30 cm. Juli-August	0.50
Saponaria (Seifenkraut) ocymoides. Niederliegend, karminrot, 20 cm, Juni	0.50
Satureia (syn. Calamintha) alpina. Bergminze. Polsterbildende Alpine mit	
violetten Lippenblüten. 15 cm. Mai-August	0.50
Saxifraga (Steinbrech) moosartige:	
" hybrida grandiflora alba. Großblumig, weiß	
,, Blütenteppich. Leuchtend rosa, 10 cm, April-Mai .	0.50

		1 St. M.
Saxifro	aga hybrida magnifica. Großblütig, hellrosa, 20 cm, Mai	0.50
"	" Purpurmantel. Karminrosa, 15 cm, April-Mai	0.50
"	" Schöne von Ronsdorf. Dunkelkarmin, 15 cm, April-Juni	
"	,, rosea superba. Frisch karminrosa, 15 cm, April-Mai	0.60
"	" splendens. Leuchtend dunkelkarmin, 15 cm, Mai	
"	moosartige Hybriden, alle Farben gemischt	0.40
"	rosettenartige:	
"	aizoides crocea. Lockere Polster, orangegelbe Blüten. Für feuchte	
"	Stellen. Juni-Juli. 10 cm	0.60
"	aizoon. Weiß. 25 cm. luni-luli	0.60
"	apiculata. Blaugrüne Blattrosetten in dichten Polstern. Hellgelbe	STEE TESTING
.,	61". 10	0.60
"	cotyledon pyramidalis. Weiß, 50 cm, Juni-Juli	0.60
"	Elisabethae. Hybride mit hellschwefelgelben Blütenpolstern.	
	April, 10 cm	0.60
"	Gaudinii. Silbergraue Rosetten mit weißen Blüten	0.50
"	oppositifolia latina. Niedriger, kriechender Wuchs. Blüten	
	purpurn. 3—5 cm	0.70
"	umbrosa. Jehovablümchen. Fleischfarbig-rosa, 30 cm, April-Mai	0.30
Sedum		
"	anacampseros. Blaugrün, Blüten purpurn. Kriechend, 15 cm, Juli-Aug.	
"	Ewersii turkestanicum. Kräftig wachsend. Blüten dunkelrosa. 10 cm	
"	lydium glaucum. Weißlich, bluagrüne Belaubung, Juni	0.30
"	" aureum. Belaubung goldgelb	0.40
"		0.50
"	laconicum. Fleischige, runde Blätter, Blüten weiß. 10 cm. Juli .	0.30
"	Middendorffianum. Kriechend, Knospen orange, Blüten goldgelb.	
"	10 cm. Juli	0.50
"	obtusifolium. Gelb, 10 cm, Juni, Blätter bräunlich	0.50
"	reflexum. Leuchtend gelb, 15 cm, Juni, Blätter graugrün	
"	spurium. Matt rosa, 20 cm, Juli-August	0.30
"	" splendens. 20 cm, dunkelrot, Juli-August	0.50
Sempe	rvivum (Hauslauch). Rosetten hellgrün, dunkelgrün, blaugrün, purpurn,	
w	eiß übersponnen. Alpha u. Beta siehe Neuheiten, Abt. A II.	
	rvivum: globiferum arachnoideum Moggridgei	
	paniculatum glaucum Reginge Amaliae	
	paniculatum glaucum Reginae Amaliae rupicolum tomentosum Thomayeri	
	rupicolum tomentosum Thomayeri	
	rupicolum tomentosum Thomayeri triste	
Silene	rupicolum tomentosum Thomayeri triste je Sorte 0.40 je Sorte 0.50 je Sorte 0.60	
	rupicolum tomentosum Thomayeri triste je Sorte 0.40 je Sorte 0.50 je Sorte 0.60 Schafta (Alpenleimkraut). Rasenbildend, Blumen leuchtend rosa. 10 cm	0.50
A	rupicolum tomentosum Thomayeri triste je Sorte 0.40 je Sorte 0.50 je Sorte 0.60 Schafta (Alpenleimkraut). Rasenbildend, Blumen leuchtend rosa. 10 cm	0.50
Spergu	rupicolum tomentosum Thomayeri triste je Sorte 0.40 je Sorte 0.50 je Sorte 0.60 Schafta (Alpenleimkraut). Rasenbildend, Blumen leuchtend rosa. 10 cm jugust	0.50
Spergu Stachy	rupicolum tomentosum Thomayeri triste  je Sorte 0.40 je Sorte 0.50 je Sorte 0.60  Schafta (Alpenleimkraut). Rasenbildend, Blumen leuchtend rosa. 10 cm ugust ula pilifera siehe Sagina subulata. s (Ziest) lanata. Einfassungspflanze mit weißwolligen Blättern. lüten purpurn. 30–40 cm. Juli	0.30
Spergu Stachy	rupicolum tomentosum Thomayeri triste  je Sorte 0.40 je Sorte 0.50 je Sorte 0.60  Schafta (Alpenleimkraut). Rasenbildend, Blumen leuchtend rosa. 10 cm ugust ula pilifera siehe Sagina subulata. s (Ziest) lanata. Einfassungspflanze mit weißwolligen Blättern. lüten purpurn. 30–40 cm. Juli	0.30
Spergu Stachy Thymu	rupicolum tomentosum Thomayeri triste  je Sorte 0.40 je Sorte 0.50 je Sorte 0.60  Schafta (Alpenleimkraut). Rasenbildend, Blumen leuchtend rosa. 10 cm ugust ula pilifera siehe Sagina subulata. s (Ziest) lanata. Einfassungspflanze mit weißwolligen Blättern. lüten purpurn, 30–40 cm, Juli s (Thymian) serpyllum albus. Frischgrüne Polster, 5 cm, weiß, Juni-Juli	0.30 0.50
Spergu Stachy Thymu	rupicolum tomentosum Thomayeri triste  je Sorte 0.40 je Sorte 0.50 je Sorte 0.60  Schafta (Alpenleimkraut). Rasenbildend, Blumen leuchtend rosa. 10 cm ugust s (Ziest) lanata. Einfassungspflanze mit weißwolligen Blättern. lüten purpurn, 30–40 cm, Juli s (Thymian) serpyllum albus. Frischgrüne Polster, 5 cm, weiß, Juni-Juli serpyllum lanuginosus. Graue Polster, rosa Blüten, Juli	0.30 0.50 0.50
Spergu Stachy Thymu	rupicolum tomentosum Thomayeri triste  je Sorte 0.40 je Sorte 0.50 je Sorte 0.60  Schafta (Alpenleimkraut). Rasenbildend, Blumen leuchtend rosa. 10 cm lugust la pilifera siehe Sagina subulata.  s (Ziest) lanata. Einfassungspflanze mit weißwolligen Blättern. lüten purpurn, 30–40 cm, Juli s (Thymian) serpyllum albus. Frischgrüne Polster, 5 cm, weiß, Juni-Juli serpyllum lanuginosus. Graue Polster, rosa Blüten, Juli , splendens. Leuchtend rot, polsterbildend, Juni-Juli	0.30 0.50 0.50 0.50
Spergu Stachy Thymu "," Tiarella Tunica	rupicolum tomentosum Thomayeri triste  je Sorte 0.40 je Sorte 0.50 je Sorte 0.60  Schafta (Alpenleimkraut). Rasenbildend, Blumen leuchtend rosa. 10 cm lugust la pilifera siehe Sagina subulata. s (Ziest) lanata. Einfassungspflanze mit weißwolligen Blättern. lüten purpurn, 30–40 cm, Juli s (Thymian) serpyllum albus. Frischgrüne Polster, 5 cm, weiß, Juni-Juli serpyllum lanuginosus. Graue Polster, rosa Blüten, Juli ,, splendens. Leuchtend rot, polsterbildend, Juni-Juli a cordifolia (Schaumpflanze). Zierl. weiße Blüten, 20 cm, Mai, Halbschatt. saxifraga alba (Steinnelke). Aus zierlicher Belaubung erscheinen den	0.30 0.50 0.50 0.50 0.50
Spergu Stachy Thymu "," Tiarella Tunica	rupicolum tomentosum Thomayeri triste  je Sorte 0.40 je Sorte 0.50 je Sorte 0.60  Schafta (Alpenleimkraut). Rasenbildend, Blumen leuchtend rosa. 10 cm lugust la pilifera siehe Sagina subulata. s (Ziest) lanata. Einfassungspflanze mit weißwolligen Blättern. lüten purpurn, 30–40 cm, Juli s (Thymian) serpyllum albus. Frischgrüne Polster, 5 cm, weiß, Juni-Juli serpyllum lanuginosus. Graue Polster, rosa Blüten, Juli ,, splendens. Leuchtend rot, polsterbildend, Juni-Juli a cordifolia (Schaumpflanze). Zierl. weiße Blüten, 20 cm, Mai, Halbschatt. saxifraga alba (Steinnelke). Aus zierlicher Belaubung erscheinen den	0.30 0.50 0.50 0.50 0.50
Spergu Stachy Thymu "" Tiarelle Tunica	rupicolum triste  je Sorte 0.40 je Sorte 0.50 je Sorte 0.60  Schafta (Alpenleimkraut). Rasenbildend, Blumen leuchtend rosa. 10 cm lugust  la pilifera siehe Sagina subulata.  s (Ziest) lanata. Einfassungspflanze mit weißwolligen Blättern. lüten purpurn, 30–40 cm, Juli  s (Thymian) serpyllum albus. Frischgrüne Polster, 5 cm, weiß, Juni-Juli serpyllum lanuginosus. Graue Polster, rosa Blüten, Juli	0.30 0.50 0.50 0.50 0.50
Spergu Stachy Thymu "" Tiarelle Tunica	rupicolum triste  je Sorte 0.40 je Sorte 0.50 je Sorte 0.60  Schafta (Alpenleimkraut). Rasenbildend, Blumen leuchtend rosa. 10 cm lugust  ja pilifera siehe Sagina subulata.  s (Ziest) lanata. Einfassungspflanze mit weißwolligen Blättern.  lüten purpurn, 30–40 cm, Juli  s (Thymian) serpyllum albus. Frischgrüne Polster, 5 cm, weiß, Juni-Juli serpyllum lanuginosus. Graue Polster, rosa Blüten, Juli splendens. Leuchtend rot, polsterbildend, Juni-Juli a cordifolia (Schaumpflanze). Zierl. weiße Blüten, 20 cm, Mai, Halbschatt. saxifraga alba (Steinnelke). Aus zierlicher Belaubung erscheinen den anzen Sommer zierliche weiße Blüten, 15 cm  ica (Ehrenpreis) repens. Weißlich, rasenbildend, Mai-Juni	0.30 0.50 0.50 0.50 0.50 0.40
Spergu Stachy Thymu "" Tiarelle Tunica Veroni	rupicolum triste  je Sorte 0.40 je Sorte 0.50 je Sorte 0.60  Schafta (Alpenleimkraut). Rasenbildend, Blumen leuchtend rosa. 10 cm jugust  ja pilifera siehe Sagina subulata.  s (Ziest) lanata. Einfassungspflanze mit weißwolligen Blättern. lüten purpurn, 30–40 cm, Juli  s (Thymian) serpyllum albus. Frischgrüne Polster, 5 cm, weiß, Juni-Juli serpyllum lanuginosus. Graue Polster, rosa Blüten, Juli  s splendens. Leuchtend rot, polsterbildend, Juni-Juli  a cordifolia (Schaumpflanze). Zierl. weiße Blüten, 20 cm, Mai, Halbschatt. saxifraga alba (Steinnelke). Aus zierlicher Belaubung erscheinen den anzen Sommer zierliche weiße Blüten, 15 cm  ica (Ehrenpreis) repens. Weißlich, rasenbildend, Mai-Juni  teucrium rupestris. Amethystblau, kriechend, 10 cm, Juni-Juli	0.30 0.50 0.50 0.50 0.50 0.40 0.40 0.50
Spergu Stachy Stachy Thymu "" Tiarelle Tunica Veroni Vinca	rupicolum triste  je Sorte 0.40 je Sorte 0.50 je Sorte 0.60  Schafta (Alpenleimkraut). Rasenbildend, Blumen leuchtend rosa. 10 cm Jugust  Ja pilifera siehe Sagina subulata.  s (Ziest) lanata. Einfassungspflanze mit weißwolligen Blättern.  lüten purpurn, 30–40 cm, Juli  s (Thymian) serpyllum albus. Frischgrüne Polster, 5 cm, weiß, Juni-Juli serpyllum lanuginosus. Graue Polster, rosa Blüten, Juli  , splendens. Leuchtend rot, polsterbildend, Juni-Juli a cordifolia (Schaumpflanze). Zierl. weiße Blüten, 20 cm, Mai, Halbschatt. saxifraga alba (Steinnelke). Aus zierlicher Belaubung erscheinen den anzen Sommer zierliche weiße Blüten, 15 cm  (a (Ehrenpreis) repens. Weißlich, rasenbildend, Mai-Juni teucrium rupestris. Amethystblau, kriechend, 10 cm, Juni-Juli (Immergrün) major. Großblättrig, blaublütig, Mai-Juni minor. Kleinblättrig	0.30 0.50 0.50 0.50 0.50 0.40 0.50 0.50 0.30
Spergu Stachy Stachy Thymu "" Tiarelle Tunica Veroni Vinca	rupicolum triste  je Sorte 0.40 je Sorte 0.50 je Sorte 0.60  Schafta (Alpenleimkraut). Rasenbildend, Blumen leuchtend rosa. 10 cm Jugust  Ja pilifera siehe Sagina subulata.  s (Ziest) lanata. Einfassungspflanze mit weißwolligen Blättern.  lüten purpurn, 30–40 cm, Juli  s (Thymian) serpyllum albus. Frischgrüne Polster, 5 cm, weiß, Juni-Juli serpyllum lanuginosus. Graue Polster, rosa Blüten, Juli  , splendens. Leuchtend rot, polsterbildend, Juni-Juli a cordifolia (Schaumpflanze). Zierl. weiße Blüten, 20 cm, Mai, Halbschatt. saxifraga alba (Steinnelke). Aus zierlicher Belaubung erscheinen den anzen Sommer zierliche weiße Blüten, 15 cm  (a (Ehrenpreis) repens. Weißlich, rasenbildend, Mai-Juni teucrium rupestris. Amethystblau, kriechend, 10 cm, Juni-Juli (Immergrün) major. Großblättrig, blaublütig, Mai-Juni minor. Kleinblättrig	0.30 0.50 0.50 0.50 0.50 0.40 0.50 0.50 0.30
Spergu Stachy Stachy Thymu "" Tiarelle Tunica Veroni Vinca	rupicolum triste  je Sorte 0.40 je Sorte 0.50 je Sorte 0.60  Schafta (Alpenleimkraut). Rasenbildend, Blumen leuchtend rosa. 10 cm lugust  Ja pilifera siehe Sagina subulata.  s (Ziest) lanata. Einfassungspflanze mit weißwolligen Blättern.  lüten purpurn, 30–40 cm, Juli  s (Thymian) serpyllum albus. Frischgrüne Polster, 5 cm, weiß, Juni-Juli serpyllum lanuginosus. Graue Polster, rosa Blüten, Juli splendens. Leuchtend rot, polsterbildend, Juni-Juli a cordifolia (Schaumpflanze). Zierl. weiße Blüten, 20 cm, Mai, Halbschatt. saxifraga alba (Steinnelke). Aus zierlicher Belaubung erscheinen den anzen Sommer zierliche weiße Blüten, 15 cm  ca (Ehrenpreis) repens. Weißlich, rasenbildend, Mai-Juni teucrium rupestris. Amethystblau, kriechend, 10 cm, Juni-Juli (Immergrün) major. Großblättrig, blaublütig, Mai-Juni minor. Kleinblättrig  fol. arg. var. Weißbunte Belaubung  fol. aur. var. Kleinblättriges Immergrün, gelbbunte Belaubung	0.30 0.50 0.50 0.50 0.50 0.40 0.50 0.50 0.40 0.4
Spergu Stachy Stachy Thymu "" Tiarelle Tunica Veroni Vinca	rupicolum triste  je Sorte 0.40 je Sorte 0.50 je Sorte 0.60  Schafta (Alpenleimkraut). Rasenbildend, Blumen leuchtend rosa. 10 cm lugust  pla pilifera siehe Sagina subulata.  s (Ziest) lanata. Einfassungspflanze mit weißwolligen Blättern.  lüten purpurn, 30–40 cm, Juli  s (Thymian) serpyllum albus. Frischgrüne Polster, 5 cm, weiß, Juni-Juli  serpyllum lanuginosus. Graue Polster, rosa Blüten, Juli  " splendens. Leuchtend rot, polsterbildend, Juni-Juli  a cordifolia (Schaumpflanze). Zierl. weiße Blüten, 20 cm, Mai, Halbschatt.  saxifraga alba (Steinnelke). Aus zierlicher Belaubung erscheinen den anzen Sommer zierliche weiße Blüten, 15 cm  (ca (Ehrenpreis) repens. Weißlich, rasenbildend, Mai-Juni  teucrium rupestris. Amethystblau, kriechend, 10 cm, Juni-Juli  (Immergrün) major. Großblättrig, blaublütig, Mai-Juni  " fol. arg. var. Weißbunte Belaubung  " fol. aur. var. Kleinblättriges Immergrün, gelbbunte Belaubung  cornuta (Hornveilchen) G. Wermia. Veilchenblau. 20 cm, Mai-Oktober	0.30 0.50 0.50 0.50 0.50 0.40 0.50 0.30 0.40 0.40 0.80 0.40
Spergu Stachy Stachy Thymu "" Tiarelle Tunica Veroni Vinca "" Vinca	rupicolum triste  je Sorte 0.40 je Sorte 0.50 je Sorte 0.60  Schafta (Alpenleimkraut). Rasenbildend, Blumen leuchtend rosa. 10 cm lugust  pla pilifera siehe Sagina subulata.  s (Ziest) lanata. Einfassungspflanze mit weißwolligen Blättern.  lüten purpurn, 30–40 cm, Juli  s (Thymian) serpyllum albus. Frischgrüne Polster, 5 cm, weiß, Juni-Juli  serpyllum lanuginosus. Graue Polster, rosa Blüten, Juli  " splendens. Leuchtend rot, polsterbildend, Juni-Juli  a cordifolia (Schaumpflanze). Zierl. weiße Blüten, 20 cm, Mai, Halbschatt.  saxifraga alba (Steinnelke). Aus zierlicher Belaubung erscheinen den anzen Sommer zierliche weiße Blüten, 15 cm  (ca (Ehrenpreis) repens. Weißlich, rasenbildend, Mai-Juni  teucrium rupestris. Amethystblau, kriechend, 10 cm, Juni-Juli  (Immergrün) major. Großblättrig, blaublütig, Mai-Juni  " fol. arg. var. Weißbunte Belaubung  " fol. aur. var. Kleinblättriges Immergrün, gelbbunte Belaubung  cornuta (Hornveilchen) G. Wermia. Veilchenblau. 20 cm, Mai-Oktober	0.30 0.50 0.50 0.50 0.50 0.40 0.50 0.30 0.40 0.40 0.80 0.40
Spergu Stachy Stachy Thymu "" Tiarelle Tunica Veroni Vinca "" Vinca	rupicolum triste  je Sorte 0.40 je Sorte 0.50 je Sorte 0.60  Schafta (Alpenleimkraut). Rasenbildend, Blumen leuchtend rosa. 10 cm lugust  pla pilifera siehe Sagina subulata.  s (Ziest) lanata. Einfassungspflanze mit weißwolligen Blättern.  lüten purpurn, 30–40 cm, Juli  s (Thymian) serpyllum albus. Frischgrüne Polster, 5 cm, weiß, Juni-Juli  serpyllum lanuginosus. Graue Polster, rosa Blüten, Juli  " splendens. Leuchtend rot, polsterbildend, Juni-Juli  a cordifolia (Schaumpflanze). Zierl. weiße Blüten, 20 cm, Mai, Halbschatt.  saxifraga alba (Steinnelke). Aus zierlicher Belaubung erscheinen den anzen Sommer zierliche weiße Blüten, 15 cm  (ca (Ehrenpreis) repens. Weißlich, rasenbildend, Mai-Juni  teucrium rupestris. Amethystblau, kriechend, 10 cm, Juni-Juli  (Immergrün) major. Großblättrig, blaublütig, Mai-Juni  " fol. arg. var. Weißbunte Belaubung  " fol. aur. var. Kleinblättriges Immergrün, gelbbunte Belaubung  cornuta (Hornveilchen) G. Wermia. Veilchenblau. 20 cm, Mai-Oktober	0.30 0.50 0.50 0.50 0.50 0.40 0.50 0.30 0.40 0.40 0.80 0.40
Spergu Stachy Stachy Thymu "" Tiarelle Tunica Veroni Vinca "" Viola	rupicolum triste  je Sorte 0.40 je Sorte 0.50 je Sorte 0.60  Schafta (Alpenleimkraut). Rasenbildend, Blumen leuchtend rosa. 10 cm lugust  la pilifera siehe Sagina subulata.  s (Ziest) lanata. Einfassungspflanze mit weißwolligen Blättern. lüten purpurn, 30 – 40 cm, Juli  s (Thymian) serpyllum albus. Frischgrüne Polster, 5 cm, weiß, Juni-Juli  serpyllum lanuginosus. Graue Polster, rosa Blüten, Juli  splendens. Leuchtend rot, polsterbildend, Juni-Juli  a cordifolia (Schaumpflanze). Zierl. weiße Blüten, 20 cm, Mai, Halbschatt.  saxifraga alba (Steinnelke). Aus zierlicher Belaubung erscheinen den anzen Sommer zierliche weiße Blüten, 15 cm  ica (Ehrenpreis) repens. Weißlich, rasenbildend, Mai-Juni  teucrium rupestris. Amethystblau, kriechend, 10 cm, Juni-Juli (Immergrün) major. Großblättrig, blaublütig, Mai-Juni  minor. Kleinblättrig  "fol. aur. var. Kleinblättriges Immergrün, gelbbunte Belaubung  "merten Mauve. Malvenfarbig, sehr schön  "Newton Mauve. Malvenfarbig, sehr schön  "Royal Scott. Violettblau mit hellerer Mitte	0.30 0.50 0.50 0.50 0.50 0.40 0.50 0.40 0.4
Spergu Stachy Stachy Thymu "" Tiarelle Tunica Veroni Vinca "" Viola	rupicolum triste  je Sorte 0.40 je Sorte 0.50 je Sorte 0.60  Schafta (Alpenleimkraut). Rasenbildend, Blumen leuchtend rosa. 10 cm lugust  la pilifera siehe Sagina subulata.  s (Ziest) lanata. Einfassungspflanze mit weißwolligen Blättern. lüten purpurn, 30 – 40 cm, Juli  s (Thymian) serpyllum albus. Frischgrüne Polster, 5 cm, weiß, Juni-Juli  serpyllum lanuginosus. Graue Polster, rosa Blüten, Juli  splendens. Leuchtend rot, polsterbildend, Juni-Juli  a cordifolia (Schaumpflanze). Zierl. weiße Blüten, 20 cm, Mai, Halbschatt.  saxifraga alba (Steinnelke). Aus zierlicher Belaubung erscheinen den anzen Sommer zierliche weiße Blüten, 15 cm  ica (Ehrenpreis) repens. Weißlich, rasenbildend, Mai-Juni  teucrium rupestris. Amethystblau, kriechend, 10 cm, Juni-Juli (Immergrün) major. Großblättrig, blaublütig, Mai-Juni  minor. Kleinblättrig  "fol. aur. var. Kleinblättriges Immergrün, gelbbunte Belaubung  "merten Mauve. Malvenfarbig, sehr schön  "Newton Mauve. Malvenfarbig, sehr schön  "Royal Scott. Violettblau mit hellerer Mitte	0.30 0.50 0.50 0.50 0.50 0.40 0.50 0.40 0.4
Spergu Stachy Stachy Thymu "" Tiarelle Tunica Veroni Vinca "" Viola	rupicolum triste  je Sorte 0.40 je Sorte 0.50 je Sorte 0.60  Schafta (Alpenleimkraut). Rasenbildend, Blumen leuchtend rosa. 10 cm ugust pla pilifera siehe Sagina subulata.  s (Ziest) lanata. Einfassungspflanze mit weißwolligen Blättern. lüten purpurn, 30–40 cm, Juli serpyllum albus. Frischgrüne Polster, 5 cm, weiß, Juni-Juli serpyllum lanuginosus. Graue Polster, rosa Blüten, Juli splendens. Leuchtend rot, polsterbildend, Juni-Juli sazifraga alba (Steinnelke). Aus zierlicher Belaubung erscheinen den anzen Sommer zierliche weiße Blüten, 15 cm (Ehrenpreis) repens. Weißlich, rasenbildend, Mai-Juni teucrium rupestris. Amethystblau, kriechend, 10 cm, Juni-Juli (Immergrün) major. Großblättrig, blaublütig, Mai-Juni minor. Kleinblättrig fol. aur. var. Kleinblättriges Immergrün, gelbbunte Belaubung cornuta (Hornveilchen) G. Wermig. Veilchenblau, 20 cm, Mai-Oktober graff. Alpha. Großblumig, dunkel veilchenblau, Newton Mauve. Malvenfarbig, sehr schön, Royal Scott. Violettblau mit hellerer Mitte, White Perfection. Reinweiß	0.30 0.50 0.50 0.50 0.50 0.40 0.50 0.40 0.4
Spergustachy Stachy Stachy Thymu  "" Tiarella Tunica Veroni Vinca  "" Viola	rupicolum triste  je Sorte 0.40 je Sorte 0.50 je Sorte 0.60  Schafta (Alpenleimkraut). Rasenbildend, Blumen leuchtend rosa. 10 cm lugust publifera siehe Sagina subulata.  s (Ziest) lanata. Einfassungspflanze mit weißwolligen Blättern. lüten purpurn, 30–40 cm, Juli serpyllum albus. Frischgrüne Polster, 5 cm, weiß, Juni-Juli serpyllum lanuginosus. Graue Polster, rosa Blüten, Juli seplendens. Leuchtend rot, polsterbildend, Juni-Juli acordifolia (Schaumpflanze). Zierl. weiße Blüten, 20 cm, Mai, Halbschatt. saxifraga alba (Steinnelke). Aus zierlicher Belaubung erscheinen den anzen Sommer zierliche weiße Blüten, 15 cm (Ehrenpreis) repens. Weißlich, rasenbildend, Mai-Juni teurium rupestris. Amethystblau, kriechend, 10 cm, Juni-Juli (Immergrün) major. Großblättrig, blaublütig, Mai-Juni minor. Kleinblättrig "fol. aur. var. Kleinblättriges Immergrün, gelbbunte Belaubung cornuta (Hornveilchen) G. Wermig. Veilchenblau, 20 cm, Mai-Oktober graff. Alpha. Großblumig, dunkel veilchenblau "Newton Mauve. Malvenfarbig, sehr schön "Royal Scott. Violettblau mit hellerer Mitte "White Perfection. Reinweiß, White Perfection. Reinweiß, White Perfection. Reinweiß	0.30 0.50 0.50 0.50 0.50 0.40 0.50 0.40 0.4
Spergustachy Stachy Stachy Thymu  '' Tiarelle Tunica Veroni Vinca  '' Viola  '' '' '' '' '' '' '' '' '' ''	rupicolum triste  je Sorte 0.40 je Sorte 0.50 je Sorte 0.60  Schafta (Alpenleimkraut). Rasenbildend, Blumen leuchtend rosa. 10 cm jugust planta. Einfassungspflanze mit weißwolligen Blättern. lüten purpurn, 30 – 40 cm, Juli serpyllum albus. Frischgrüne Polster, 5 cm, weiß, Juni-Juli serpyllum lanuginosus. Graue Polster, rosa Blüten, Juli selendens. Leuchtend rot, polsterbildend, Juni-Juli saxifraga alba (Steinnelke). Aus zierlicher Belaubung erscheinen den anzen Sommer zierliche weiße Blüten, 15 cm (Ehrenpreis) repens. Weißlich, rasenbildend, Mai-Juni teucrium rupestris. Amethystblau, kriechend, 10 cm, Juni-Juli (Immergrün) major. Großblättrig, blaublütig, Mai-Juni minor. Kleinblättrig fol. aur. var. Kleinblättriges Immergrün, gelbbunte Belaubung cornuta (Hornveilchen) G. Wermig. Veilchenblau, 20 cm, Mai-Oktober graft. Alpha. Großblumig, dunkel veilchenblau, Newton Mauve. Malvenfarbig, sehr schön, Royal Scott. Violettblau mit hellerer Mitte, White Perfection. Reinweiß curulata graft. siehe papilionacea! gracilis Lord Nelson. Neue Varietät mit sehr schönen, tief purpurvioletten Blumen, März bis August blühend	0.30 0.50 0.50 0.50 0.50 0.40 0.50 0.40 0.4
Spergustachy Stachy Stachy Thymu  '' Tiarelle Tunica Veroni Vinca  '' Viola  '' '' '' '' '' '' '' '' '' ''	rupicolum triste  je Sorte 0.40 je Sorte 0.50 je Sorte 0.60  Schafta (Alpenleimkraut). Rasenbildend, Blumen leuchtend rosa. 10 cm jugust planta. Einfassungspflanze mit weißwolligen Blättern. lüten purpurn, 30 – 40 cm, Juli serpyllum albus. Frischgrüne Polster, 5 cm, weiß, Juni-Juli serpyllum lanuginosus. Graue Polster, rosa Blüten, Juli selendens. Leuchtend rot, polsterbildend, Juni-Juli saxifraga alba (Steinnelke). Aus zierlicher Belaubung erscheinen den anzen Sommer zierliche weiße Blüten, 15 cm (Ehrenpreis) repens. Weißlich, rasenbildend, Mai-Juni teucrium rupestris. Amethystblau, kriechend, 10 cm, Juni-Juli (Immergrün) major. Großblättrig, blaublütig, Mai-Juni minor. Kleinblättrig fol. aur. var. Kleinblättriges Immergrün, gelbbunte Belaubung cornuta (Hornveilchen) G. Wermig. Veilchenblau, 20 cm, Mai-Oktober graft. Alpha. Großblumig, dunkel veilchenblau, Newton Mauve. Malvenfarbig, sehr schön, Royal Scott. Violettblau mit hellerer Mitte, White Perfection. Reinweiß curulata graft. siehe papilionacea! gracilis Lord Nelson. Neue Varietät mit sehr schönen, tief purpurvioletten Blumen, März bis August blühend	0.30 0.50 0.50 0.50 0.50 0.40 0.50 0.40 0.4
Spergustachy Stachy Stachy Thymu  "" Tiarelle Tunica Veroni Vinca  "" Viola  "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "	rupicolum triste  je Sorte 0.40 je Sorte 0.50 je Sorte 0.60  Schafta (Alpenleimkraut). Rasenbildend, Blumen leuchtend rosa. 10 cm logust  pla pilifera siehe Sagina subulata.  s (Ziest) lanata. Einfassungspflanze mit weißwolligen Blättern. lüten purpurn, 30–40 cm, Juli  s (Thymian) serpyllum albus. Frischgrüne Polster, 5 cm, weiß, Juni-Juli  serpyllum lanuginosus. Graue Polster, rosa Blüten, Juli  serpyllum lanuginosus. Graue Polster, rosa Blüten, Juli  serpyllum lanuginosus. Aus zierlicher Belaubung erscheinen den anzen Sommer zierliche weiße Blüten, 20 cm, Mai, Halbschatt.  saxifraga alba (Steinnelke). Aus zierlicher Belaubung erscheinen den anzen Sommer zierliche weiße Blüten, 15 cm  (a (Ehrenpreis) repens. Weißlich, rasenbildend, Mai-Juni  teucrium rupestris. Amethystblau, kriechend, 10 cm, Juni-Juli (Immergrün) major. Großblättrig, blaublütig, Mai-Juni  minor. Kleinblättrig  "fol. arg. var. Weißbunte Belaubung  "fol. aur. var. Kleinblättriges Immergrün, gelbbunte Belaubung  cornuta (Hornveilchen) G. Wermig. Veilchenblau, 20 cm, Mai-Oktober  "grafi. Alpha. Großblumig, dunkel veilchenblau  "Newton Mauve. Malvenfarbig, sehr schön  "Royal Scott. Violettblau mit hellerer Mitte  "Royal Scott. Violettblau mit hellerer Mitte  "White Perfection. Reinweiß  cucullata grafi. siehe papilionacea!  gracilis Lord Nelson. Neue Varietät mit sehr schönen, tief purpurvioletten Blumen, März bis August blühend  papilionacea grandiflora. Pfingstveilchen, tiefblau, Mai-Juni  odorata (wohlriechendes Veilchen) alba. Weiß, großblumig, März-	0.30 0.50 0.50 0.50 0.50 0.40 0.50 0.40 0.4
Spergustachy Stachy Stachy Thymu  '' Tiarella Tunica Veroni Vinca  '' Viola	rupicolum triste  je Sorte 0.40 je Sorte 0.50 je Sorte 0.60  Schafta (Alpenleimkraut). Rasenbildend, Blumen leuchtend rosa. 10 cm logust  pla pilifera siehe Sagina subulata.  s (Ziest) lanata. Einfassungspflanze mit weißwolligen Blättern. lüten purpurn, 30–40 cm, Juli  s (Thymian) serpyllum albus. Frischgrüne Polster, 5 cm, weiß, Juni-Juli  serpyllum lanuginosus. Graue Polster, rosa Blüten, Juli  serpyllum lanuginosus. Graue Polster, rosa Blüten, Juli  serpyllum lanuginosus. Aus zierlicher Belaubung erscheinen den anzen Sommer zierliche weiße Blüten, 20 cm, Mai, Halbschatt.  saxifraga alba (Steinnelke). Aus zierlicher Belaubung erscheinen den anzen Sommer zierliche weiße Blüten, 15 cm  (a (Ehrenpreis) repens. Weißlich, rasenbildend, Mai-Juni  teucrium rupestris. Amethystblau, kriechend, 10 cm, Juni-Juli (Immergrün) major. Großblättrig, blaublütig, Mai-Juni  minor. Kleinblättrig  "fol. arg. var. Weißbunte Belaubung  "fol. aur. var. Kleinblättriges Immergrün, gelbbunte Belaubung  cornuta (Hornveilchen) G. Wermig. Veilchenblau, 20 cm, Mai-Oktober  "grafi. Alpha. Großblumig, dunkel veilchenblau  "Newton Mauve. Malvenfarbig, sehr schön  "Royal Scott. Violettblau mit hellerer Mitte  "Royal Scott. Violettblau mit hellerer Mitte  "White Perfection. Reinweiß  cucullata grafi. siehe papilionacea!  gracilis Lord Nelson. Neue Varietät mit sehr schönen, tief purpurvioletten Blumen, März bis August blühend  papilionacea grandiflora. Pfingstveilchen, tiefblau, Mai-Juni  odorata (wohlriechendes Veilchen) alba. Weiß, großblumig, März-	0.30 0.50 0.50 0.50 0.50 0.40 0.50 0.40 0.4
Spergustachy Stachy Stachy Thymu  "" Tiarella Tunica Veroni Vinca  "" Viola  "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "	rupicolum triste  je Sorte 0.40 je Sorte 0.50 je Sorte 0.60  Schafta (Alpenleimkraut). Rasenbildend, Blumen leuchtend rosa. 10 cm logust  pla pilifera siehe Sagina subulata.  s (Ziest) lanata. Einfassungspflanze mit weißwolligen Blättern. lüten purpurn, 30–40 cm, Juli  s (Thymian) serpyllum albus. Frischgrüne Polster, 5 cm, weiß, Juni-Juli  serpyllum lanuginosus. Graue Polster, rosa Blüten, Juli  serpyllum lanuginosus. Graue Polster, rosa Blüten, Juli  serpyllum lanuginosus. Aus zierlicher Belaubung erscheinen den anzen Sommer zierliche weiße Blüten, 20 cm, Mai, Halbschatt.  saxifraga alba (Steinnelke). Aus zierlicher Belaubung erscheinen den anzen Sommer zierliche weiße Blüten, 15 cm  (a (Ehrenpreis) repens. Weißlich, rasenbildend, Mai-Juni  teucrium rupestris. Amethystblau, kriechend, 10 cm, Juni-Juli (Immergrün) major. Großblättrig, blaublütig, Mai-Juni  minor. Kleinblättrig  "fol. arg. var. Weißbunte Belaubung  "fol. aur. var. Kleinblättriges Immergrün, gelbbunte Belaubung  cornuta (Hornveilchen) G. Wermig. Veilchenblau, 20 cm, Mai-Oktober  "grafi. Alpha. Großblumig, dunkel veilchenblau  "Newton Mauve. Malvenfarbig, sehr schön  "Royal Scott. Violettblau mit hellerer Mitte  "Royal Scott. Violettblau mit hellerer Mitte  "White Perfection. Reinweiß  cucullata grafi. siehe papilionacea!  gracilis Lord Nelson. Neue Varietät mit sehr schönen, tief purpurvioletten Blumen, März bis August blühend  papilionacea grandiflora. Pfingstveilchen, tiefblau, Mai-Juni  odorata (wohlriechendes Veilchen) alba. Weiß, großblumig, März-	0.30 0.50 0.50 0.50 0.50 0.40 0.50 0.40 0.4
Spergustachy Stachy Stachy Thymu  '' Tiarella Tunica Veroni Vinca  '' Viola  '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '	rupicolum triste  je Sorte 0.40 je Sorte 0.50 je Sorte 0.60  Schafta (Alpenleimkraut). Rasenbildend, Blumen leuchtend rosa. 10 cm logust  pla pilifera siehe Sagina subulata.  s (Ziest) lanata. Einfassungspflanze mit weißwolligen Blättern. lüten purpurn, 30–40 cm, Juli  s (Thymian) serpyllum albus. Frischgrüne Polster, 5 cm, weiß, Juni-Juli  serpyllum lanuginosus. Graue Polster, rosa Blüten, Juli  serpyllum lanuginosus. Graue Polster, rosa Blüten, Juli  serpyllum lanuginosus. Aus zierlicher Belaubung erscheinen den anzen Sommer zierliche weiße Blüten, 20 cm, Mai, Halbschatt.  saxifraga alba (Steinnelke). Aus zierlicher Belaubung erscheinen den anzen Sommer zierliche weiße Blüten, 15 cm  (a (Ehrenpreis) repens. Weißlich, rasenbildend, Mai-Juni  teucrium rupestris. Amethystblau, kriechend, 10 cm, Juni-Juli (Immergrün) major. Großblättrig, blaublütig, Mai-Juni  minor. Kleinblättrig  "fol. arg. var. Weißbunte Belaubung  "fol. aur. var. Kleinblättriges Immergrün, gelbbunte Belaubung  cornuta (Hornveilchen) G. Wermig. Veilchenblau, 20 cm, Mai-Oktober  "grafi. Alpha. Großblumig, dunkel veilchenblau  "Newton Mauve. Malvenfarbig, sehr schön  "Royal Scott. Violettblau mit hellerer Mitte  "Royal Scott. Violettblau mit hellerer Mitte  "White Perfection. Reinweiß  cucullata grafi. siehe papilionacea!  gracilis Lord Nelson. Neue Varietät mit sehr schönen, tief purpurvioletten Blumen, März bis August blühend  papilionacea grandiflora. Pfingstveilchen, tiefblau, Mai-Juni  odorata (wohlriechendes Veilchen) alba. Weiß, großblumig, März-	0.30 0.50 0.50 0.50 0.50 0.40 0.50 0.40 0.4
Spergustachy Stachy Stachy Thymu  "" Tiarella Tunica Veroni Vinca  "" Viola  "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "	rupicolum triste  je Sorte 0.40 je Sorte 0.50 je Sorte 0.60  Schafta (Alpenleimkraut). Rasenbildend, Blumen leuchtend rosa. 10 cm logust  pla pilifera siehe Sagina subulata.  s (Ziest) lanata. Einfassungspflanze mit weißwolligen Blättern. liüten purpurn, 30—40 cm, Juli  s (Thymian) serpyllum albus. Frischgrüne Polster, 5 cm, weiß, Juni-Juli serpyllum lanuginosus. Graue Polster, rosa Blüten, Juli splendens. Leuchtend rot, polsterbildend, Juni-Juli a cordifolia (Schaumpflanze). Zierl. weiße Blüten, 20 cm, Mai, Halbschatt. saxifraga alba (Steinnelke). Aus zierlicher Belaubung erscheinen den anzen Sommer zierliche weiße Blüten, 15 cm (ca (Ehrenpreis) repens. Weißlich, rasenbildend, Mai-Juni teucrium rupestris. Amethystblau, kriechend, 10 cm, Juni-Juli (Immergrün) major. Großblättrig, blaublütig, Mai-Juni minor. Kleinblättrig  fol. arg. var. Weißbunte Belaubung fol. aur. var. Kleinblättriges Immergrün, gelbbunte Belaubung cornuta (Hornveilchen) G. Wermig. Veilchenblau  nother graft. Alpha. Großblumig, dunkel veilchenblau  nother graft. Siehe papilionacea! gracilis Lord Nelson. Neue Varietät mit sehr schönen, tief purpurvioletten Blumen, März bis August blühend papilionacea grandiflora. Pfingstveilchen, tiefblau, Mai-Juni odorata (wohlriechendes Veilchen) alba. Weiß, großblumig, März- April	0.30 0.50 0.50 0.50 0.50 0.40 0.50 0.40 0.4

									1 St. M.
Viola	odorata	<b>Deutsche Kaiser</b>	rin. Blau	gefüllt					. 0.60
,,	"	Königin Charlot	te .						. 0.40
"	"	Riese von Botno	ang. Seh	ir großbl	umig,	dunkelb	lau		. 0.50
Wulfe	enia cari	nthiaca. Prächtig	ge Scrop	hulariace	e mit	blauer	n Blüt	ten ir	1
	ährigen Tr	auben. Für Halbsc	hatten, lie	bt lehmi	ge Erd	le. 20	cm.	Juli	. 0.60



Blühende Opuntia polyacantha (syn. missouriensis), winterharter Feigenkaktus, Sedum, Saxifraga und Sempervivum am Kakteenhügel meines Schaugartens.

## D. Winterharte Kakteen.

Zur Bepflanzung warm und sonnig gelegener Felsenanlagen, Trockenmauern, Böschungen und Abhänge bilden die aus den Hochgebirgen Nord- und Zentral-Amerikas stammenden winterharten Kakteen mit ihren eigenartig geformten, fleischigen Gliedern und ihrem prächtigen Blütenflor in gelben, orangefarbigen, in rosa und roten Tönungen ein schätzbares Material von eigenartig fremdländischem Charakter.

Zum Versuch empfehle ich nachfolgend angeführte Sorten:

	zom versoch empreme ich nachfolgena angelomre sorren.	
Opuntia	arborescens. Baumartig wachsender Feigenkaktus mit rundlichen, weißbestachelten Gliedern und scharlachroten Blüten. Selten. Je nach Größe	5.—
"	brachyarthra. Kurze, plattwalzenförmige Glieder, Blüten gelb .	1.50
"	camanchica. Kreisrunde, flache Glieder, stark bewehrt, Blüten gelb	2.—
	,, major. Stark wachsend, mit besonders schöner Bestachelung	2
"	" minor. Kleingliedriger als vorige, Blüte gelb	2
"	humifusa (syn. Rafinesquii) var. arkansana. Länglich-eiförmige	
"	große Glieder, stark bewehrt, Blüten hellgelb, mitten gemsfarbig	2.—
"	"var. oplocarpa. Platt-eirundliche Glieder, am oberen Teil stark mit mittellangen Stacheln bewehrt, unten schwach besetzt. Blüten groß, grünlichweiß	2.50
"	humilis. Mit verkehrt eirunden und höckerigen Stachelpolstern, Blüten gelb und rötlich	1.50
"	mesacantha cymochila. Länglichrunde Glieder mit zahlreichen, scharfspitzigen Stacheln und Widerhaken. Blüten gelb mit grünlichem Schimmer	2.—
"	pachyclada rosea. Höckerige, langgestreckte walzenförmige Glieder mit teils sehr langen, teils kürzeren sehr scharfspitzigen Stacheln.	2.—
		2.
"	polyacantha (syn. missouriensis). Platte, kreisförmige, stark be- wehrte Glieder. Blüten gelb, innen orange	2.—
"	rhodantha. Mit länglich graugrünen, walzenförmigen Gliedern und höckerigen Borstenpolstern, Blüte karminrot	3.—

		1 St. M.
Opuntia	rutila. Eine der schönsten winterharten Opuntien, Glieder dick, läng- lich-walzenförmig, mit langen weißen Stacheln stark bewehrt	3.—
"	sphaeacantha. Große platte, wenig bestachelte Glieder. Selten	
"	spirocentra. Aehnlich camanchica, aber längere weiße Stacheln	
"	xanthostemma. Kurze, rundlich platte Glieder, Blüten rötlich-gelb	2.—
**	species 3. Plattrundliche, langgestreckte Glieder mit sehr langen	
,,	species G. 23. Platte, langgestreckte Glieder mit langen, in der	3.—
	Jugend bräunlichen, später weißlichen Stacheln, stark bewehrt	3.—
"	species 52. Lange, ovale, große Glieder, rosenrote Blüten	2.—



Opuntia humifusa var. oplocarpa. Einzelblüte. Am Kakteenhügel meines Schaugartens.

## E. Winterharte Freiland-Farne.

Farne lieben lockeren (laubhaltigen), oder durch Lauberde oder Torfmull verbesserten Boden. Zur Bepflanzung schattiger Stellen im Garten, auf Felsenanlagen und dergleichen, bieten sie eine Fülle des prächtigsten Materials.

			um (Krullfarn oder Venushaar). Zierliche winterhaarn) siehe unter Dryopteris und Polystichum!	rte /	Art	2.—
			enfarn) trichomanes. Haarfarnähnlich			0.50
Athyrium	(F	arnwe	ibchen filix femina			0.40
"	f.	fem.	Fritzelliae. Mit gekrausten, schmalen Wedeln .			0.80
"	**	"	curtum multifidum. Petersilienbüschen ähnlich .			0.80
"		"	laciniatum. Mit gefranzten Wedelchen			0.80
"		"	ramo-cristatum. Kammartig verzweigt			0.80
"	**	"	cruciato-grandiceps. Kreuzweise gekraust			1
"	"	"	Vernoniae			3.—

										1 St. M.
Blechnum sp	icant (Rip	openfarn). \	Wintergrün, F	euchtig	ceit lie	bend			+	0.50
Cystopteris	asplenioi	des. Streif	enfarn ähnlich	1						0.50
"	fragilis.	Zierlicher al	s voriger .							0.50
Dryopteris fi	lix-mas.	(syn. Aspidi	um filix-ma	5.). Far	nmänr	chen	. Hei	m. Fo	arn	0.40
"	"	Barnesii.	Kräfrig wachs	end, sd	nön					0.80
"	"	decorum.	Zierliches Fai	nmänn	chen					0.80
"	"	grandicep	<ol> <li>Großköpfi einlaubig, line</li> </ol>	g						0.80
"	"	lineare. F	einlaubig, line	ear .		+				1
"	"	monstrosu	m. Kammart	ig gekr	aust					0.80
"	Linnaean	a (syn. Poly)	podium dry	pteris	). Mit z	ierlic	hen \	Wed	eln	0.60
"	phegopte	eris (syn. Po	lypodium p	hegop	teris).	Buch	enfa	rn		0.60
"	spinulosa	(syn. Aspid	ium spinulo:	sum).	Kleinde	ornar	tig b	ebär	tet	0.40
Matteucia st	truthiopte	eris (syn. S	truthiopteri	s geri	manic	a).	Stra	ußfa	rn,	
he	eimische A	rt	sylvanische A							0.70
,, p	ennsylva	nica. Penn:	sylvanische Ar	t						1.50
Onoclea sen	sibilis. /	Amerikan. Su	mpffarn, präd	thtig .						0.80
Osmunda cir	nnamome	ea. Königst	farn mit zimtk	raunen	Fruch	twed	eln			2
,, CI	aytonian	a. Mit sam	tartig erscheir	nender	Belaub	pung				2
,, gr	acilis. Zi	erlicher Kön	igsfarn .							1.50
,, re	galis. He	eimischer Kö	nigsfarn .							1.20
Phyllitis scol	opendriu	m (syn. Sco	lopendrium	vulga	re). h	Hirsch	zung	e		0.50
"	"	digitato	-cristatum.	Finger	förmig	get	eilte	Wee	del	1.50
"	"	margina	atum. Mit z	ierlich o	ekrau:	stem	Rand	١.		2
"	"	undulat	um. Mit am	Rande	gewe	Iten	Wed	eln		2
Polypodium	(Tüpfelfar	n). Siehe D	ryopteris Li	nnaea	na.					
"	phegopt	eris. Buche	nfarn. Siehe	Dryo	oteris.					
"	vulgare.	Heimischer	Tüpfelfarn							0.40
"	"	grande.	Große Form							0.60



#### Seltenere Freilandfarne:

Polystichum aculeatum, Polystichum rotundatum, Adiantum pedatum,
Athyrium laciniatum und Felsensträucher:
Evonymus radicans, Cotoneaster horizontalis in meinem Felsengarten.

Polystichum										0.80
"	angulare	cristatum (A	spidium). Bi	attspit	zenge	kraus	, win	ergr	un	0.80
"	"	divisilobum.								0.80
"	"	proliferum.	Zierlich zer	teilte	Wede	l, brut	bilde	end	2.8	0.80
"	"	rotundatum					nen			1.—
"	11	venustum cr					+			0.80
"		(Aspidium).	Wintergrün.	Gelo	ppte	Fiede	rcher	, äh	ın-	0.80
"	The second secon	culeatum . (Aspidium).	Wintergrün	:	: :			:	:	0.80

				1	1 St. M.
Polystichum munitum (Aspidium). Nordamerikanische	W	inter	grün		1
,, paleaceum (Aspidium). Spreuschuppenart					0.80
,, polydactylum. Vielfingerig					0.80
Stableri	*			*	1
Pteridium aquilinum (syn. Pteris aquilina). Adlerfarn Pteris aquilina — Pteridium. Scolopendrium vulgare, siehe Phyllitis.		٠		٠	0.40
Selaginella Douglasii. Moosfarn, selten. Kriechend Struthiopteris, siehe Matteucia.	•				0.80



Winterharte Freilandfarne: Blechnum, Matteucia, Athyrium und Polystichum in verschiedenen Sorten im halbschattigen Felsengarten meiner Gärtnerei.


## F. Feuchtigkeit liebende Stauden.

(Beschreibung und Preise siehe unter Stauden B. und C.)

Ajuga — Aralia — Astilbe in Sorten — Bergenia (Megasia) — Caltha — Epilobium — Eupatorium — Filipendula — Hemerocallis — Heracleum — Hosta (Funkia) — Iris pseudacorus — Iris Gueldenstaedtiana — Iris Monnieri — Iris ochroleuca — Iris Kaempferi — Iris sibirica — Lysimachia — Myosotis palustris — Peltiphyllum (Saxifraga) peltatum — Polemonium — Physostegia — Primula frondosa — Primula japonica — Primula pulverulenta — Primula rosea — Ranunculus gramineus — Rheum — Rodgersia — Saxifraga umbrosa — Senecio clivorum — Spiraea — Thalictrum — Tiarella — Trollius.

## G. Felsensträucher und Schlinger.

	sus (syn. Ampelopsis) Veitchii. Prächtiger, selbstklimmender Efeu-
wein, B	lätter im Herbst blutrot gefärbt 1. bis 2
Berberis bu	xifolia dulcis nana. Reizende, niedrige Berberitze, immergrün.
Für Fel	spartien. 30-40 cm
	r Dammeri (syn. humifusa). Kriechende Zwergmispel mit nieder-
	liegenden Zweigen. Scharlachrote Früchte im Herbst 1.50 bis 2.50
"	Dielsiana (syn. applanata). Starkwachsende Art mit ovalen
	dunkelgrünen Blättern und glänzend roten Beeren 1.—
"	Franchetii. Höherer Strauch mit unterseits weißgelbfilziger Be-
	laubung. Früchte orangerot, 150 cm hoch 1.50
"	horizontalis. Fächerartig wachsend, rote Früchte . 1.— bis 2.—
"	pyrenaica (syn. microphylla glacialis). Reizender Felsen-
	strauch mit kleinen dunkelgrünen Blättern u. roten Früchten 1.50 bis 2.50
"	Simonsii. Blüten rötlichweiß. Beeren korallrot. 150 cm 1.50



Cotoneaster horizontalis, reich mit Beeren besetzt im Felsengarten meiner Gärtnerei.


1 St. M.

Cytisus scoparius (Spartium scoparium). Einheimischer Ginster mit goldg	elben
Blüten  ,, var. Andreanus (Genista Andreana). Goldgelb mit p	0.80
getärbt	2.50
Evonymus nanus (rosmarinifolius). Reizender Zwergstrauch, 50—	3.— 60 cm
hoch, mit dunkelgrünen, lanzettförmigen Blättchen, der im Herbst Fülle rosafarbiger Samenkapseln trägt	1.50
Evonymus radicans var. Arnold Arboretum. Völlig hart, kriech. u. sc	hling. 0.50
", reticulata (syn. argenteo-variegata). Weißbuntbl Forsythia suspensa. Stark wachsend, rankend und schlingend, goldgelb, Fuchsia Riccartoniana. Winterharte Fuchsie für geschützte Stellen Winter zurückzuschneiden und mit Laub zuzudecken. Reichblühende	April 0.50
mit scharlachroten Blüten. Pflanzen mit Ballen 1  Genista dalmatica. Stacheliger, niedriger Ginster mit einer Fülle gelbe	.— bis 1.50
Juni-Juli erscheinender Schmetterlingsblüten	1.50
Lonicera nitida. Immergrün, der echt. Brautmyrte ähneInd, reizend " pileata. Immergrün, buxusähnliche Belaubung, Früchte violett Potentilla Farreri. Zierlich, gelbe Erdbeerblüten, langandauernder Blüher Ribes alpinum. Gedeiht noch im tiefsten Schatten. Bleibt lange belau Salix retusa. Niedrige, kriechende Weide für Felspartien	0.50—1.— 0.50—1.— 0.50—0.75 bt . 0.50
Zwerg-Koniferen:	
Picea excelsa var. nana. Dichtzweigige, niedrige Fichte für Fo anlagen. Junge Pflanzen mit Topfballen	1.— oder
Marie Pavie. Herrliche Polyantha-Rose mit zart fleischfarbig-weißen B bis zum Frost anhaltender Blüher, stark duftend Dorothy Perkins. Herrliche dunkellachsrosa, gefülltblühende Schling	0.80
riesige Dolden, Blumen stark duftend, haltbar. Pflanze stark wach und gesund Frl. Octavia Hesse. Köstlich duftende, Edelrosen ähnlich blühende Sch	
rose, Knospen der bekannten "Kaiserin AugVictoria" ähnlich, Pf stark rankend, mit prächtig glänzendem Laub. Blüten sehr lange ha	lanze

# H.Moorbeetpflanzen, winterharte Azaleen, Rhododendrum und Heidekräuter.

In schneelosen Wintern ist eine leichte Bedeckung mit Tannenreisig anzuraten. Die Azaleen und Rhododendrum gehören zu unseren schönsten Blütensträuchern. Sie lieben lockere Heide-, Laub- oder Moorerde. Sie nehmen auch mit jedem, durch Torfmull verbesserten Gartenboden fürlieb.

Torfmull verbesserten Gartenboden fürlieb.	1	St. M.
Andromeda japonica. Lavendelheide. Japanische Ericacee. Imm		1 31. m.
Blütenstrauch mit prächtigen weißen Blütenähren. März April	3.— bis	6
Azalea Arendsii. Winterharte, neue Azaleenkreuzungen, die mit ihr		
grünen Belaubung an Azalea indica erinnern. Die Pflanzen si		
ordentlich reichblühend. Blumen wohlgeformt, 5-8 cm Dm		
Blüten variierend von zart lila, zart rosa, bis leuchtend karmi		
Winter ist ein Bedecken des Bodens mit Laub zu empfehler		
ein Schutz der Pflanzen durch Tannenreisig		5
ladifolia siaha Dhadadandaum ladifolium		
mollie by builder siche Dhadadanduum impanieum		
", pontica siehe Rhododendrum flavum		
Yadanawa Harricha cattlevenfarbine Azalas	6 bis	12
Gaultheria procumbens. Kriechende, 20 cm hohe Ericacee mit		
pergamentlederartigen Blättern, weißen Blütchen u. leuchtend-		
roten Beeren. Wintergrün		2.50
Gaultheria shallon. In allen Teilen größer werdend als vorige.		
Beeren dunkelpurpurfarben, später blau-schwarz. Halb-		
schatten liebende, bodenbedeckende Moorbeetpflanze		3.50
Kalmia latifolia. Lorbeerrose. Immergrüne Moorbeetpflanze mit		
glänzend dunkelgrüner Belaubung und becherförmigen, in		
Dolden stehenden hellrosa Blüten	3.— bis	6
Rhododendrum catawbiense grdfl. Prachtvolle, große lila Blüten.		
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	4 bis	6
Cunninghamii. Sehr schöne, immergrüne Art mit		1777
weißen Blütendolden	4 bis	6
,, flavum (syn. Azalea pontica) hybridum. Ein-		
fach und gefüllt blühende Hybriden in verschiedenen		
	5.— bis	6
,, flavum var. Daviesii. Außerordentlich reich		
blühende Azalee, gesund wachsend und völlig		
winterhart. Blüten rahmweiß mit gelb schattiert.		
Prachtvoll	5.— bis	6
Prachtvoll  imbricatum. Niedrige Art mit glänzendgrünen		
Blättern und dunkelvioletten Blüten	4.— bis	5
" japonicum (syn. Azalea mollis) hybridum.		
Prächtige Hybriden in gelben, orange bis roten		
Schattierungen	5.— bis	6.—
,, kamtschaticum. Laubabwerfende, zwergige Art	THE PERSON	
mit großen rosa Einzelblüten im Mai. 10—15 cm hoch	3 bis	4
,, ledifolium album (syn. Azalea ledifolia alba).		
Reichblühende, reinweiße, wintergrüne Azalee	4.— bis	8.—
,, maximum roseum. Rosablühende, starkwüchsige	A STATE OF THE STATE OF	
Alpenrose. Wintergrün	3.50 bis	5
,, praecox. Frühblühende lila Alpenrose	3.50 bis	
,, roseum elegans. Prächtig rosa. Wintergrün	4.— bis	
Heidekräuter:		
Calluna vulgaris Alportii Gravasiino Triobo mit dunkalestan Blütan	0.80 bis	1
Calluna vulgaris Alportii. Graugrüne Triebe, mit dunkelroten Blüten	0.80 bis	
" cuprea. Belaubung rötlich-gelb, Blüten lila .	U.OU DIS	1
" , fl. pl. Mit dichtgefüllten lila Blüten, schönstes	0.80 bis	1
aller Heidekräuter	0.80 bis	
", " nana. Rotblühende Zwergform	U.OU DIS	1.
Erica carnea (syn. herbacea). Winterhartes Heidekraut, das schon oft von Februar ab mit leuchtend rosenroten Blüten		
	0.70 bis	1
überdeckt ist	O. O DIS	1.
그는 그들은 그는 그는 그들은 그는		
Blüten leuchtend karmin, hervorragende Neuein- führung. 15 cm. März-April	1 - bir	1.50
romong. 15 cm. Marz-April	1 1/13	1.50



Blühende Erica mediterranea hybrida in meinem Schaugarten.

Frien mediterranea bybride Street - Steek likk and also serves	1	St. M.
Erica mediterranea hybrida. Etwas später blühend als »carnea«. Blüten leuchtend dunkelrosa; außerordentlich lange andauernd	0.70 bis	1
" tetralix. Heimische Glockenheide mit rosa Blütenglöckchen " tetralix alba. Graufilzige Glockenheide mit weißen Blüten Menziesia empetrifolia. Kriechendes Heidekraut mit breit-	0.80 bis 0.80 bis	
nadeliger Belaubung und leuchtend rosenroten Blütenglöckchen im Mai	0.80 bis	1. —

## J. Winterharte Seerosen — Nymphaeen.

Die Kultur der Wasserpflanzen und besonders die der winterharten tropischen Nymphaeen habe ich von Jahr zu Jahr mehr gepflegt. Es gibt kaum dankbarere Pfleglinge unter den Kindern Floras, als die tropischen Schwestern unserer heimischen, weißen Seerose, der Nymphaea alba, die fast alle von Ende Mai bis Oktober ununterbrochen ihre lieblichen Blumen in den prächtigsten Farbenschattierungen entfalten und das Auge des Beschauers entzücken.

Kleinere, 50—100 cm weite und 30—60 cm tiefe, hölzerne, gereinigte Wassergefäße (durchsägte Fässer u. dergl.) je nach Art der betreffenden Pflanzen, also größer oder kleiner, die an einem möglichst vor rauhen Winden geschützten und recht sonnigen Platze im Garten eingegraben und etwa ½ Fuß hoch mit reiner, lehmiger Gartenerde und dann mit Wasser gefüllt werden, genügen zur Kultur der verschiedensten Wasserpflanzen.

Es ist bei Bestellungen von Laien geraten, mir gütigst anzugeben, wohin die Seerosen u. a. gepflanzt werden sollen, damit ich Vorschläge machen, resp. die geeignete Auswahl von Sorten treffen kann. Nur auf diese Weise bleiben Nicht-

Alle hier angeführten Wasserpflanzen, bei denen nichts näheres angegeben ist, sind auch in unserem norddeutschen Klima (bei minus 20 Grad Celsius) winterhart und bedürfen in Teichen und Seen keines Schutzes im Winter; in kleinen Bassins oder eingegrabenen durchsägten Fässern kultivierte Pflanzen schützt man durch eine auf übergelegte Stangen ausgebreitete und die Behälter überragende Tannenreisig-Deckung oder sonstwie.

NB. Dm. bedeutet Durchmesser der Blumen, Wstd. bedeutet den für die

Kultur der betreffenden Sorte erforderlichen Wasserstand.

Versand ab Mitte April bis Anfang August.

#### Broschüre über: Kultur der Seerosen und anderer Wasserpflanzen im Freien mit 12 Abbildungen Mk. 0.40; postfrei Mk. 0.45. 1 St. M. Nymphaea alba. Heimische weiße Seerose, 30-100 cm Wstd. je nach Stärke 1.50 bis 3.hybrida atropurpurea. Tief karmesin, 18 cm Dm., 40-80 cm Wstd. 8. - bis 12. colossea. Fleischfarbig, 15-20 cm Dm., 40-100 cm Wstd. . 6.— bis 10.— Escarboucle. Zinnoberrot, 15-20 cm Dm., 40-100 cm Wstd. . 10.— bis 12. – Froebelli. Feurig dunkelrot, 10-15 cm Dm., bis 10.— 30-100 cm Wstd. . Graciella. Zierliche orangerötliche Varietät für kleine Behälter, 20-40 cm Wstd. 6.— bis 8.— Laydekeri rosea. Karmoisinrot, 10-15 cm Dm., 30-80 cm Wstd. bis 10. – Marliacea albida. Milchweiß, 10—18 cm Dm., 22 5.— bis 8.— 50 - 100 cm Wstd. carnea. Hellfleischfarbig, 10 – 18 cm 08 Dm., 50-100 cm Wstd. 4.— bis 6. chromatella. Nielgelb, 10-18 cm Dm., 50-100 cm Wstd. . 5.- bis 8.rosea. Hellrosa, 10-18 cm Dm., 22 50-100 cm Wstd. 6.- bis 9.-Mr. James Brydon. Halbgefüllt, kugelförmig, violettrot, 12-15 cm Dm., 40-100 cm Wstd. . 10.- bis 12.-Sioux. Kupfriggelb mit rot verwaschen, 40-6.-bis 8.-60 cm Wstd. . Vesuv. Feurig amarant, 10-15 cm Dm., 40-80 cm Wstd. 10. - bis 15.-W.B. Shaw. Großblumig, zartrosa, wohlriechend 5.— bis 6.— Wm. Falconer. Dunkel granatrot, 10-15 cm .. Dm., 40-80 cm Wstd. . . . . . . 10.— bis 15. odorata pumila (minor). Zwergform von odorata rosea. 30-50 cm Wstd. rosea. Rosa, 10-15 cm Dm., 40-80 cm Wstd. 3.- bis 6.-



Nymphaea odorata Rosennymphe in meinem großen Seerosenbassin in Blüte.

Name		Pasannumuha Nauhait aisansa 7usht. Hass	1	St. M.
Nymphae	ea oaoraia	Rosennymphe. Neuheit eigener Zucht. Herr- liche, duftende Blüte, leuchtend hellrosa, 12 – 18 cm	0 1:1	0
"	"	Dm., 40—80 cm Wstd	8.— bis i	2.—
,,	tuberosa	100 cm Wstd	8.— bis 1	2.—
"	"	20 cm Dm., 50-100 cm Wstd.  Pöstlingberg. Riesenblüten,	4.— bis	7.—
		schneeweiß, größte aller winterharten Seerosen (eig. Einführ.) 15—22 cm Dm., 50—100 cm Wstd.	6.— bis	8.—
"	"	Helen Fowler. Reinrosa, 10—20 cm Dm., 40—80 cm Wstd.	6.— bis	8.—
"	"	maxima. Reinweiß, 10—15 cm Dm., 40—100 cm	4.— bis	6.—
"	"	Wstd. <b>Richardsonii.</b> Ballförmig gefüllt, schnee- weiß, 12—18 cm Dm., 40—80 cm Wstd	5.— bis	8.—
.,	"	rosea. Zartrosa, 10—15 cm Dm., 50—80 cm Wstd.	5.— bis	8.—
K. Su	mpf-	und Wasserpflanzen fürs	Frei	e.
		mus). Für Sumpf und flachen Wasserstand .		0.60
"	,, var	iegatus. Buntblättrig	(	0.90
		oschlöffel). Sumpf und flaches Wasser		0.50
wohl	riechenden v	weißen Blumen, liebt 30-100 cm tiefen Wasse	rstand.	
Läng	lich ovale Bl	ätter und knolliger Wurzelstock		2
Calla get	hiopica sie	(Wasserviole). Sumpf und flaches Wasser . he <b>Zantedeschia.</b>		0.50
		pfkalla für flachen Wasserstand, Juni-Juli .		0.70
Caltha po	alustris fl. p	ol. Gefüllte Sumpfdotterblume, Mai	(	0.70
Ceratoph	yllum dem	ersum (Hornkraut). Unterwasserpflanze	0.50 bis	
		echendes Cypergras), wird bei guter Kultur im Freien		1.50
hoch	wie Cyperus	asper. Kronenblötter scharfspitzig. Frostfrei zu über	wintern	1.50
Elisma na	tans. Schwi	mmblätter oval, Blüten weiß, auf dem Wasser schwir	nmend,	0.50
Glyceria	aquatica v	erstand ariegata (syn. Gl. spectabilis fol. var.). Sü	ssaras	0.50
Weis	ss und grün	längs gestreiftes Gras für feuchte Stellen u. flaches	Wasser (	0.70
Hippuris	vulgaris (To	innenwedel). Sumpf und Wasser	!	0.30
		ne, dichte Büsche bildende, blaugrüne Binse . e <b>Scirpus Tabernaemontanus.</b>		0.40
		phaeoides (syn.Villarsia nymphaeoides). See	kanne.	
Brau	nmarmorierte	Schwimmblätter u. gelbe Blüten. 30—50 cm Wasse	erstand (	
		aria (Pfennigkraut). Uferpflanze		
		auklerblume. Prächtige Sumpfpflanze für ges		0.50
Stelle	en. Blüten o	relb, kupfrig getuscht	(	0.50
		erle von Ronnenberg (Vergißmeinnicht) illatum. Quirlständiges Tausendblatt		
myriopny		illatum. Quirlständiges Tausendblatt		0.40
Nuphar k	Calmianum	<ul> <li>Zierliche Teichrose, 30—50 cm Wasserstand</li> </ul>		3.—
Polygonu	m bistorta	(Wasserknöterich). Flaches Wasser	(	0.50
Ronunculi	us lingua (	(Wasser-Hyacinthe). 20 cm Wasserstand . Wasser-Hahnenfuß). Meterhoch, flaches Wasser		0.50
Sagittario	sagittifoli	(Pfeilkraut). Sumpf oder Wasser	(	0.30
Scirpus To	abernaemo	i <b>a</b> (Pfeilkraut). Sumpf oder Wasser Intanus (syn. <b>Juncus zebrinus).</b> Zebrabinse. Für	Sumpf	
Sparagni	flachen Was	serstand		0.40
Stratiotes	aloides (	Wasseraloe). Untergetaucht wachsend, mit den S	Spitzen	
aus (	dem Wasser	hervorragend. Blüten weiß	(	0.80
inalia de	ig-eirund R	rnamentale Blattpflanze, 50—70 cm hoch. Blätte lütenähren violett. Frostfrei zu überwintern	1.50 bis	3 —
Typha lat	tifolia (Rohr	kolben). Breitblättrig	(	0.50
Typha mi	nima. Zier	kolben). Breitblättrig licher Rohrkolben, 30—40 cm Wasserstand		1.50
		i <b>des</b> siehe <b>Limnanthemum nymphaeoides.</b> thardia) <b>aethiopica.</b> Bekannte großblumige <b>Zin</b>	amer-	
		Sommermonaten gut im Freien zu kultivieren, au		
		rstand geeignet		1.50

# L. Winterharte Ziergräser.

											1	St. M.
rohr.	ria japonia Altere Pfla	anzen ohne	Schutz	winterl	hart.	3 m	hoc	h we	rden	d.	Je	
nach	Stärke .					1				2	DIS	8.—
Arundo d Verlo	Stärke . lonax. Kla angt etwas \	rinettenroh Winterschut:	r. 2 m	hoch	wachse	end,	für	feuch	ten l	Bode	en.	1.50
Bambusa	Metake si	ehe Arunc	linaria	iapon	ica.					2.1		Transfer
"	nana. Zw					wai	to A	التقامية	fer hi	ilden	d	
"	aber did nigra sieh	htbuschig .										1.50
"	nigra sieh	e Phyllost	achys i	nigra.						22.5	100	dig to
	Simonii.										bis	4.—
Cyperus	asper (hart	es Cypergr	as). 1	m hoc	h, für	Sun	ıpf	und	flach	en	la ta	1 50
was	serstand	11.0						,		1.50	DIS	1.50
Elymus gl	serstand <b>aucus.</b> Mete	erhohes Gro	is mit bre	eiten, s	chon b	lauw	eits b	ereit	ten B	latte	rn	0.00
Eulaka ja	ponica sieh	ie Miscant	hus sin	iensis.								
Festuca g	lauca. Bla	ugrüne Büs	che bild	lend								0.30
Glyceria	lauca. Bla aquatica f	ol. varieg	. (syn. C	31. spe	ctabi	lis fo	ol. v	ar.).	We	iß ur	nd	
grün	längs gestr	eiftes Gras	für feu	chte St	ellen							0.70
Imperata	saccharifl	ora siehe	Miscan	thus s	acche	rife	r.					
	us saccharit	fer (syn. In	nperate	a sacci	narifi	ora).	. St	ielblü	teng	ras n	nit	
	federigen	Blütenstän gracillimu	den									0.70
	sinensis	aracillim	is (syn.	Eula	lia i	apon	ica	ara	cillin	ma).		
"	3111011313	Ahnlich de	m Pame	asaras		apo.		9		1.—	bis	2
		variegati	is levn	Fulalie	a ian	fol	ver	) M	it we	ißhu	nt	-
"	"	costroitton	Blätter	LUIGIII	a lub.	101.	war.	., ,	1	50	hie	3
		gestreiften	/www.Essi	 		- b f		n1ma		-11-1:	-L	u.
**	"	zebrinus	(syn. EU)	iaiia ji	ap. ze	eprin	ia).	DIGI	rer g	eibii	CH L.I.	2
			querge:	streitt					. 1	.50	DIS	J.—
"	"	"		s. Stro	att au	trech	te B	elaub	oung,	son	151	2
			wie vor	ige						.50	DIS	3
Phalaris (	arundinace	a picta.	Weißbu	untes B	andgr	as						0.50
	chys nigra											
Bam	busrohr. Ve	rlangt unte	n etwas	Winte	rschut	Z				4.—	bis	6.—



Miscanthus sinensis variegatus (syn. Eulalia) am Ufer eines Seerosen-Bassins in meinem Schaugarten.

# M. Aquarienpflanzen.

Freien gedeihend	0.50 0.40 0.50
Sagittaria leucopetala (japonica). Pfeilkraut mit großen, einfachen Blüten Saururus Loureiri. Blätter herzförmig, Blüten in endständiger Traube, Pflanze aus dem Wasser wachsend	0.75
Sagittaria latifolia. Sehr schöne Aquarienpflanze mit breiten Blättern und zierlichem Blütenstand	1.—
Sagittaria Engelmanniana (syn. S. gracilis). Zierliches Pfeilkraut mit kleinen Blütchen. Knollentragend	1.—
Nuphar Kalmianum. Zierliche Teichrose	0.40
,, verticillatum. Quirlständiges Tausendblatt	0.50
,, prismatum. Mit zartgefiederten Blättchen	0.50
moosartiges Tausendblatt	0.50
Lysimachia nummularia. Pfennigkraut. Blüten goldgelb	0.20
Ludwigia Mulertii. Blätter eirundlich, smaragdgrün	0.50
der mit hellgelben Blüten besetzt ist	1.—
Limnocharis flava (syn. L. emarginata). Schöne Aquarienpflanze für flachen Wasserstand mit großen, hellgrünen Blättern und großem Blütenstand,	
Ausläufer treibend	1.—
pflanze Limnobium Spongia. Amerikanischer Froschbiß mit etwas größeren Blättern,	1.—
Limnobium Bosei. Froschbiß mit kleinen, rundlichen Blättern, reizende Schwimm-	
Limnanthemum nymphaeoides (syn. Villarsia nymphaeoides). Seekanne Schwimmblätter braun marmoriert. Blüten gelb	0.50
Jussieua octonervia. Pyramidal wachsend, reichblühend	0.75
länglich-lanzettlich, weich behaart. Blüten gelb	1.—
Jussieua angustifolia. Schmalblättrig	0.40
grünlich	0.75
Hydromystria stolonifera (syn. Trianaea bogotensis). Schwimmpflanze mit rundlichen, blasig aufgetriebenen Blättern. Ausläufer treibend. Blüten	
blüten und ovalen Schwimmblättern	1.25
Hydrocleis nymphoides (syn. Limnocharis Humboldtii). Eine der aller- schönsten Aquarienpflanzen mit großen gelben dreiblättrigen Eintags-	
Hippuris vulgaris. Tannenwedel	0.40
mit dunkelgrünen, linearisch-lanzettlichen, zugespitzten Blättern und kleinen unscheinbaren, hellblauen Blüten	0.75
wachsend. Blüten klein, hellblau Heteranthera zosterifolia. Seegrasblättriges Trugkölbcken aus Brasilien,	
Heteranthera reniformis. Nierenblättriges Trugkölbchen. Reich verzweigt wachsend. Blüten klein, hellblau	1.—
pflanze	0.75
" Monniera (syn. Bacopa). In allen Teilen zierlicher als vorige . Heteranthera dubia. Schmalblättriges Trugkölbchen. Zierliche Aquarien-	1.—
umfassenden ovalen Blättern. Blüten blau	1
Herpestis (syn. Bacopa) amplexicaulis. Allerliebste Ueber- und Unterwasser- pflanze mit dickem, fleischigem Stiel und gegenständigen, stengel-	
und hellblauer Scheinähre. Schwimmpflanze  Helodea callitrichoides. Zierliche Wasserpest, reizend für Aquarien	0.30
<b>Eichhornia crassipes.</b> Wassernyazinine mit blasia autgefriebenen blattstielen	
wasserblättern und löffelförmigen Luftblättern	2.50
Cyperus pungens. Stechendes Cypergras. Kronenblätter scharfspitzig Eichhornia azurea. Hellblau blühende Wasserhyazinthe mit schmalen Unter-	1.50
Cyperus alternifolius. Wechselblättriges Cypergros 0.50 bis	1.—
Blattschuppen	0.30
Azolla filiculoides. Kleine Schwimmpflanze mit gelbgrün und braunroten	
Azolla caroliniana. Kleine, schuppenartig belaubte, sich rasch vermehrende Schwimmpflanze mit schönen hellgrün bis braunroten Blattschuppen 10 St.	0.60
Avalle equaliniane Vising schuppenestic beleubte sich work word-besein	St. M.



Meine Seerosen auf der Ausstellung in Liegnitz 1927.

## N. Gladiolen.

(Beste Pflanzzeit: Ende März bis Anfang Mai. In leichtem Boden beträgt die Pflanztiefe für die Knollen 10 cm, in schwerem Boden etwa 8 cm. Lockerung des Bodens und reichliche Bewässerung bei Trockenheit anzuraten. Wenn im Herbst die Blumen abgefroren sind, werden die Stiele etwa 5 cm über dem Erdboden abgeschnitten, die Knollen vorsichtig ausgehoben und frostfrei und trocken überwintert.)

Deutsche	Riesen-Edelg	ladiolen in besten S			St. 0.20		
"	"	,, in feinster	Mischung .	10	St. 1.60	, 1 St. (	).20
Gladiolus	gandavensis	in Mischung	100 St. 12,	10	St. 1.40	, 1 St. (	).15
"	primulinus.	in Mischung Reich- und frühblüh. p	rächtige Sorten,	10	St. 1.50	, 1 St. (	).20
"	"	In bester Mischung	100 St. 9.—,	10	St. 1.20	, 1 St. (	0.15

		(	O. Sor	timen	te.					1	5
25	Stauden in	10-20 gute	n Sorten mei	ner Wahl							1:
100	Stauden in	15-20 gute uden in 10-	n Sorten mei	ner Wahl	+			+			41
25	feinere Sta	uden in 10-	20 Sorten m	einer Wahl							1.
100	feinere Sta	uden in 15-	20 Sorten m	einer Wahl							51
25	Stauden in	10-20 der	besten Sortei	n meiner W	ahl,	darur	nter	Neu	heite	n.	11
100	Stauden in	15-20 der	besten Sorte	n meiner W	ahl,	daru	nter	Neu	heite	n. (	
100	Felsen- und	Einfassungss	stauden in au	iten älteren	Sort	en m	eine	r W	ahl		2.
100	Felsenstaud	en in 20-30	) feineren So	rten meine	r Wa	hl					3.
100	Felsenstaud	en in 20-30 en in 20-30	feinen und	seltenen So	orten	mein	er V	Vahl			5(
10	winterharte	Freilandfarn	e in guten So	orten meine	r Wo	ahl				4	4
10	,,		in besserer	Sorten me	einer	Wahl					6
10	,,		in feinen S	orten meine	er W	ahl					-
10	,,	Kakteen (Or	in feinen S ountien) in Sc I Sumpfpflan	orten meine	r Wo	ıhl					1.
10	,,	Wasser- und	Sumpfpflan	zen in Sorte	en m	einer	Wa	hl			d
10		Seerosen in	guten Sorter	n meiner W	ahl			. 4	01	bis :	5(
10			feinen Sorte						50	bis !	80
10	Dahlienknol	len in besten									
10	"		neueren So						8	bis	10
10	77	in bester	Neuheiten i	meiner Wat	ıl .						
25	**	meiner V	Vahl aus alle	n Klassen					10	bis	20
100		meiner V	Vahl aus alle	n Klassen					40.—		
100	11	memer v	Tani dos dile	II KIMAAUII			*				1

Beschreibende Dahlien-Liste auf gefl. Anfrage kostenlos!

Ueber meine Schaustellungen in Liegnitz 1927 schreibt »Der Blumenund Pflanzenbau«, Berlin, in Heft 26, Jahrgang 1927: Ein großer Teil der
Liegnitzer Wasserbecken war durch die Firma Heinrich Junge in Homeln mit einem
erlesenen Sortiment von etwa 70 Stück dieser Seerosen besetzt worden, unter denen
sich mehrere eigene Züchtungen von großer Schönheit befanden. Am meisten gefiel
davon die starkduftende, reinrosafarbene Rosennymphe, weiter die schon bekannten,
reinweißblühenden, großblumigen Sorten N. Gladstoniana und die noch riesigere,
schöne Abart N. Gladstoniana Pöstlingberg. Als die schönsten weinroten Sorten
traten dort N. Froebeli und Wm. Falconer in Erscheinung, zu welchen die gefülltblühende N. tuberosa Richardsoni ein prächtiges Gegenstück bildete. Aber auch
die bekannteren schönen Sorten, wie Marliacea albida, Marl. carnea, Marl.
rosea, W. B. Shaw, superba . . . ebenso ein buntlaubiger, weißblühender Sämling
von N. Arethusa, erregten durch ihre Schönheit viel Bewunderung.

Uber meine Stauden-Schaustellung auf der Dresdener Sonderschau vom 3. bis 6. September 1926 schreibt der ∍Blumen- und Pflanzenbau«, Berlin, Seite 297, 1926:

Die beachtenswerteste Sammlung neuerer Stauden war die von Heinrich Junge, Hameln. Außer schon bekannteren Sachen, wie Rudbeckia purpurea, Artemisia lactiflora, Phlox decussata-Sorten und Delphinium-Hybriden, fielen dort neben älteren die prächtigen neuen Aster amellus-Sorten: Kobold, Silberblick, Perkeo, Hunold, Weserperle, Lichtblick und deutscher Sieger besonders auf; weiter ein reingelbes, nur mittelhoch wachsendes und bis zum Frost remontierendes Helenium Goldene Jugend, Helenium autumnale praecox-Hybriden, die schönen, neueren Anemone japonica »Max Vogel« und »Bühler Kind«, sehr dunkelfarbige, graßblumige Aconitum Wilsoni-Hybriden, Solidago hybr. Goldelfe und Goldschleier, Liatris graminifolia dubia, Thalictrum dipterocarpum und einige reinweiße, dichtgefüllte Nymphaeen.«

Auf den großen Gartenbau-Ausstellungen zu Dresden 1926, Liegnitz 1927 und Magdeburg 1928 fand eine Prämiierung allgemein nicht statt.)

Hohe Auszeichnungen, viele silberne Medaillen, Geldpreise, goldene und silbervergoldete Medaillen, Plaketten, Ehrenpreise und als höchste Auszeichnung die große silberne kgl. preuß. Staatsmedaille, erhielt meine Firma auf den verschiedensten Gartenbau-Ausstellungen, auf denen ein Wettbewerb in Frage kam, so in Altona, Berlin, Braunschweig, Bremen, Cassel, Darmstadt, Dresden, Düsseldorf, Eberswalde, Hamburg, Hameln, Hannover, Mannheim, Minden, Pyrmont.

## Zur Beachtung!

Die beste Pflanzzeit für die meisten Stauden, besonders in rauhen Gegenden mit schneelosen Wintern und in Gegenden mit schweren Bodenarten, ist das Frühjahr, von März bis Anfang Juni. Manche Stauden, wie Paeonien, Iris und andere, werden ebenso vorteilhaft im August—September, andere wiederum bis Ende Oktober gepflanzt. Viele Sorten lassen sich jedoch bei soffenem« Wetter bis in den Winter hinein pflanzen.

Nach Eintreffen der Sendungen bei warmem, trockenem Wetter werden die Stauden nach vorsichtigem Auspacken an einem kühlen Ort am Boden ausgebreitet und tüchtig »überbraust«, besonders auch die Wurzeln! Erst nachdem die Pflanzen sich erholt haben und frisch geworden sind, werden sie, morgens oder abends am besten, an ihren Bestimmungsort gepflanzt, vorsichtig mit der Fußspitze »angetreten« und je nach Bedürfnis »angegossen«. Bei Eintreffen der Sendung in gefrorenem Zustande läßt man die Pflanzen, vor dem Auspacken, an einem frostfreien, kühlen Ort auftauen.

Die Erwartungen, welche Liebhaber in den meisten Fällen auf eine vollkommene Entwicklung ihrer Stauden schon im ersten Jahre nach der Pflanzung setzen, werden bei vielen Sorten nicht in Erfüllung gehen, denn manche Stauden erlangen, ihrem Wachstum entsprechend, ihre vollkommene Ausbildung und Schönheit erst im zweiten oder dritten Jahre nach der Pflanzung. Gewähr für das Anwachsen kann nicht übernommen werden, da von der Behandlung und Pflege alles Gedeihen abhängt.


Liebhabern, die mit der Anpflanzung von Stauden nicht vertraut sind, füge ich auf Wunsch bei Lieferung von Stauden für Anlagen jeder Art, besonders auch für Steingärten, Uferpartien, Bachläufe usw., kostenlos Bepflanzungsangaben bei.

Vorherige genaue Mitteilung über Größe, Lage (ob Sonne, Schatten, Halbschatten), Himmelsrichtung usw. der zu bepflanzenden Flächen sind erforderlich. Gegebenenfalls sind mir auch Skizzen mit bereits bestehenden Baum- oder Gehölzpflanzungen, Bauten und dergl. bei Auftragserteilung erwünscht.

Zur Besichtigung meiner Kulturen sind Interessenten stets willkommen, jedoch bitte ich, Sonntags Besuche möglichst zu unterlassen; jedenfalls aber wolle man Besuche, die für einen Sonntag geplant sind, einige Tage zuvor schriftlich anmelden.

An jedem **Feiertage** sowie **Sonntag nachmittags** bleibt meine Gärtnerei geschlossen. Die Monate Mai bis September sind für die Besichtigung meiner Kulturen am geeignetsten.

Der unberechtigte Nachdruck meines Katalog-Textes und der Nachdruck meiner Abbildungen wird strafrechtlich verfolgt!



Tägliche Personen-Dampfschiffahrt Hameln – Hann.-Münden (Mai-September).

5 Ueberland-Kraftverkehrslinien ins Weserbergland. Bahnverbindungen siehe 2. Umschlagseite vorn. — Führer durch den Verkehrsverein Hameln.

European Nursery Catalogues
A virtual collection project by:
Bücherei des Deutschen Gartenbaues e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Stauden Junge
Digital version sponsored by:
C.A.Wimmer